

## Vaccinatie tegen rotavirus

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 9/1/2007]

Een oraal vaccin tegen rotavirus werd recent geregistreerd en gecommmercialiseerd in België (Rotarix®) [zie Folia juli en september 2006]. De aanbevelingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) in verband met vaccinatie tegen rotavirus kunnen geraadpleegd worden via [www.health.fgov.be/CSH\\_HGR](http://www.health.fgov.be/CSH_HGR), klik “Adviezen en Aanbevelingen” (zoekterm: “rotavirus”).

In de geïndustrialiseerde landen zijn 15 à 50 % van de gevallen van gastro-enteritis veroorzaakt door infecties door het rotavirus; hoewel deze infecties soms ernstig zijn, is de mortaliteit laag. De HGR raadt toch de vaccinatie tegen rotavirus aan bij alle zuigelingen vanaf de leeftijd van 2 maand (zie basisvaccinatieka-

lender 2007, via [www.health.fgov.be/CSH\\_HGR](http://www.health.fgov.be/CSH_HGR), klik “Adviezen en Aanbevelingen”, zoekterm: “basisvaccinatieschema”); het vaccin mag niet toegediend worden na de leeftijd van 6 maand omwille van het verhoogde risico van intestinale invaginatie dat met een vroeger vaccin tegen rotavirus vastgesteld was bij kinderen ouder dan 6 maand.

Het vaccin lijkt eerder een effect te hebben op de ernst van de infectie dan op de incidentie ervan. De invloed van deze vaccinatie op de epidemiologie en de morbiditeit van infecties door het rotavirus in België, en de kosten-batenverhouding zijn nog niet bekend. In het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt nog een ander vaccin tegen rotavirus vermeld: Rota Teq®; dit vaccin werd geregistreerd op Europees niveau, maar is nog niet gecommmercialiseerd in België.

## Het vaccin tegen pneumokokken Prevenar® gratis ter beschikking

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 9/1/2007]

Vaccinatie met het geconjugeerd vaccin tegen 7 serotypes pneumokokken (Prevenar®) is toegevoegd aan de basisvaccinatiekalender van 2007 aanbevolen door de Belgische Hoge Gezondheidsraad. De vaccinatie bestaat uit 3 doses, op de leeftijd van 2, 4 en 12 maand (schema 2 + 1).

De Hoge Gezondheidsraad raadt voor 2007 ook een inhaalvaccinatie aan voor alle kinderen jonger dan 2 jaar volgens volgend schema.

- Voor kinderen jonger dan 10 maand: 2 doses met een interval van 8 weken, gevolgd door een booster dosis na 6 maand.
- Voor kinderen van 10 en 11 maand oud: 2 doses met een interval van 6 maand.
- Voor kinderen van 12 tot 23 maand oud: één enkele dosis.

Wat kinderen van 2 tot 5 jaar betreft, dienen enkel kinderen met een hoog risico van invasieve pneumokokkeninfectie geïmmuniseerd te worden.

Sinds januari 2007 kan Prevenar® gratis worden bekomen bij de gemeenschappen voor