

brengen van mupirocine-zalf in de neus, maar moeten ook de hele huid en de haren worden gedekoloniseerd met een ontsmettende zeep.

Voor een ziekenhuis gelden andere criteria in verband met screening.

Conclusie

Als men bovenstaande aanbevelingen in acht neemt, kan men heel wat doen om de MRSA-verspreiding terug te dringen, maar in de praktijk worden deze aanbevelingen zelden opgevolgd. Gezondheidswerkers hebben hierbij een extra verantwoordelijkheid. Door het frequent contact met MRSA-dragers lopen zij de kans deze MRSA over te dragen op andere patiënten of op familieleden die dan op hun beurt MRSA kunnen verspreiden. Eenvoudige hygiënische maatregelen, waaronder vooral een goede handhygiëne, kunnen deze verspreiding helpen indijken.

Enkele referenties

Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J en Tjemersma E. Emergence and resurgence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* as a public health threat. *Lancet* 2006;368:874-85

Gould IM. Community-acquired MRSA: can we control it? *Lancet* 2006;368:824-6

Richtlijnen ter preventie van overdracht van MRSA in woon- en zorgcentra. Consensustekst opgesteld door de multidisciplinaire werkgroep onder auspiciën van de Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in Ziekenhuizen (GOSPIZ). Juli 2005, via http://www.belgianinfectioncontrolsociety.be/pdf/MRSARVT2005/def_version_NL.pdf

Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Clostridium difficile* and ESBL-producing *Escherichia coli* in the home and community: assessing the problem, controlling the spread. An expert report commissioned by the International Scientific Forum on Home Hygiene, via http://www.ifh-homehygiene.org/2003/2library/MRSA_expert_report.pdf

Goed om weten

GEWIJZIGDE TERUGBETALINGSVOORWAARDEN VOOR HET VACCIN TEGEN ROTAVIRUS

[Reeds verschenen als Goed om weten-bericht op onze website op 6/2/2007.]

In verband met vaccinatie tegen rotavirus, zie ook Folia juli en december 2006, en februari 2007.

Het vaccin tegen rotavirus Rotarix® is sedert 1 november 2006 terugbetaald mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Sinds 1 februari 2007 zijn de terugbetalingsvoorwaarden gewijzigd: Rotarix® mag worden

terugbetaald zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven, indien de behandelende geneesheer op het voorschrift de vermelding “eerste dosis” of “tweede dosis” vermeldt. De apotheker is in dat geval gerechtigd om de derdebetalersregeling toe te passen, maar hij moet wel verifiëren dat de rechthebbende op het moment van de aflevering van het vaccin jonger is dan zes maand.