



## 2. Bloed en stolling

- 2.1. Antitrombotica
- 2.2. Antihemorragica
- 2.3. Middelen i.v.m. de bloedvorming

### 2.1. Antitrombotica

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:

- antiaggregantia
- anticoagulantia
- trombolytica.

#### Plaatsbepaling

- Antitrombotica worden gebruikt in de behandeling en in de primaire en/of secundaire preventie van diverse cardiovasculaire problemen. De antiaggregantia interfereren met de plaatjesaggregatie. De anticoagulantia werken in op verschillende niveaus van de stollingscascade.

#### Ongewenste effecten

- **Risico van bloeding met alle antitrombotische middelen.**

#### Bijzondere voorzorgen

- **Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.**
- Preoperatief stoppen van antitrombotica [zie *Folia juni 2011* en *Folia april 2016*.]
  - De beslissing om bij ingrepen de inname van antitrombotica te onderbreken, en zo ja, hoelang, hangt af van een aantal factoren:
    - de patiënt en zijn cardiovasculaire risicoprofiel: zijn er bij onderbreking belangrijke risico's van trombo-embolische verwickelingen?
    - het type ingreep:
      - ingrepen met hoog bloedingsrisico zoals bv. amygdalectomie, transurethrale prostatectomie, neurochirurgie of heelkunde t.h.v. het achterste oogsegment
      - ingrepen met laag bloedingsrisico zoals bv. cataractheelkunde, percutane vaatheelkunde, heelkunde voor carpaal tunnel
      - tandheelkundige ingrepen: de meeste ingrepen gaan gepaard met een zeer beperkt bloedingsrisico en kunnen uitgevoerd worden zonder of met minimale aanpassingen aan de antitrombotische behandeling, mits er preventief en periprocedureel voldoende maatregelen ter preventie en beperking van bloeding genomen worden.
  - Voor de verschillende antitrombotica kunnen volgende aanbevelingen worden gegeven (bron: *ACCP-richtlijnen, aanbevelingen UZGent* en richtlijn *Kennisinstituut Mondzorg*).
    - *Acetylsalicylzuur*
      - Patiënten met een laag cardiovasculair risico: acetylsalicylzuur stoppen 5-7 dagen vóór de ingreep.
      - Patiënten met een hoog cardiovasculair risico: acetylsalicylzuur niet systematisch stoppen:
        - bij ingrepen met laag bloedingsrisico de inname niet stoppen;
        - bij ingrepen met een hoog bloedingsrisico: acetylsalicylzuur stoppen 5-7 dagen vóór de ingreep.
      - Er is onvoldoende onderbouwing om tijdelijke overschakeling naar heparine aan te bevelen.
      - Herstarten 12-24 uur na de ingreep.



- *P2Y-receptorantagonisten (al dan niet in associatie met acetylsalicylzuur)*
  - Bij hoog tromboserisico (eerste 3-6 maanden na een acuut coronair syndroom of stentplaatsing) worden enkel levensnoodzakelijke ingrepen uitgevoerd, waarbij de antitrombotische medicatie wordt verdergezet, tenzij bij hoog bloedingsrisico.
  - In andere gevallen kan de toediening van de P2Y-receptorantagonisten tijdelijk onderbroken worden, maar wordt de antitrombotische behandeling wel voortgezet met acetylsalicylzuur. Voorafgaand overleg met de cardioloog is sterk aanbevolen.
  - Indien men beslist de toediening van de P2Y-receptorantagonist te onderbreken, clopidogrel 5 dagen, prasugrel minstens 7 dagen en ticagrelor minstens 3 dagen vóór electieve chirurgie stoppen; ticlopidine 10 dagen ervoor.
  - Er is onvoldoende onderbouwing om tijdelijke overschakeling naar heparine aan te bevelen.
  - Herstarten 12-24 uur na de ingreep.
- *Heparines (alle types)*
  - Ingrepen met laag bloedingsrisico: heparine niet stoppen.
  - Ingrepen met hoog bloedingsrisico: het al of niet onderbreken van heparine hangt af van de indicatie van de heparinebehandeling en moet in overleg met de behandelende arts gebeuren.
  - Herstarten 12-24 uur na de ingreep.
- *Vitamine K-antagonisten*
  - Ingrepen met laag bloedingsrisico: de vitamine K-antagonist niet stoppen.
  - Ingrepen met hoog bloedingsrisico en hoog trombo-embolisch risico: de vitamine K-antagonist stoppen en tijdelijk vervangen door een heparine met laag moleculair gewicht (overbrugging of 'bridging').
  - Ingrepen met hoog bloedingsrisico en gering trombo-embolisch risico: de vitamine K-antagonist stoppen zonder vervanging door een heparine met laag moleculair gewicht.
  - Indien de behandeling met een vitamine K-antagonist onderbroken wordt:
    - acenocoumarol 2-4 dagen voor de ingreep stoppen.
    - fenprocoumon 7-10 dagen voor de ingreep stoppen.
    - warfarine 5 dagen voor de ingreep stoppen.
    - vitamine K-antagonist herstarten 24 uur na de ingreep.
  - Indien overbrugd wordt met heparine met laag moleculair gewicht:
    - LMWH 3 dagen voor de ingreep opstarten in therapeutische dosis.
    - laatste dosis (halve dagdosis) ten laatste 24 uur voor de ingreep geven.
    - heparine 12-24 uur na de ingreep herstarten (of later bij hoog bloedingsrisico).
    - heparines doorgeven tot de therapeutische INR weer bereikt is.
- *Directe orale anticoagulantia*
  - Inhibitoren van factor Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban):
    - Voor de meeste tandheelkundige ingrepen is het niet nodig de inname te onderbreken; eventueel kan overwogen worden de inname op de ochtend van de ingreep over te slaan.
    - Ingrepen met laag bloedingsrisico: de inname 24 uur vóór de ingreep stoppen.
    - Ingrepen met hoog bloedingsrisico: de inname 48 uur vóór de ingreep stoppen (ongeacht de nierfunctie).
  - Inhibitor van trombine (dabigatran):
    - Voor de meeste tandheelkundige ingrepen is het niet nodig de inname te onderbreken; eventueel kan overwogen worden de inname op de ochtend van de ingreep over te slaan.
    - Gezien de belangrijke klaring via de nieren varieert het moment van stoppen naargelang de nierfunctie en het bloedingsrisico van de ingreep (van 24 uur voor de ingreep bij normale nierfunctie en laag bloedingsrisico tot 4 dagen voor de ingreep bij ernstige



nierinsufficiëntie en hoog bloedingsrisico, zie SKP).

- Geen tijdelijke vervanging door een heparine met laag moleculair gewicht.
- Herstarten 24 uur (laag bloedingsrisico) tot 48 uur (hoog bloedingsrisico) na de ingreep.

### 2.1.1. Antiaggregantia

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:

- acetylsalicylzuur
- de thiënoprydines (clopidogrel, prasugrel en ticlodipine)
- de reversibele P2Y-receptorantagonisten (cangrelor, ticagrelor)
- dipyridamol
- epoprostenol
- de antagonist van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren (eptifibatide, tirofiban).

#### 2.1.1.1. Acetylsalicylzuur

Acetylsalicylzuur is een irreversibele inhibitor van cyclo-oxygenase en verhindert zo de aanmaak van tromboxaan A<sub>2</sub>, waardoor de plaatjesaggregatie wordt geremd.

Enkel de preparaten op basis van acetylsalicylzuur die als antiaggregantia worden aangewend, worden hier vermeld; preparaten die koorts en pijn als indicatie hebben, worden vermeld in 8.2.2.

#### Plaatsbepaling

- *Acute fase* van acuut coronair syndroom, TIA of licht CVA en, na uitsluiten van een bloeding, van ernstig CVA: acetylsalicylzuur (bij voorkeur in oplosbare vorm; bij gebruik van maagsapresistente tabletten, deze laten stukbijten) wordt zo snel mogelijk toegediend in een eenmalige ladingsdosis van 160-325 mg, gevolgd door 80-100 mg per dag, al dan niet in associatie met een P2Y-receptorantagonist (zie 2.1.1.2.)
- *Secondaire* cardiovasculaire preventie na myocardinfarct of cerebrovasculair accident:
  - acetylsalicylzuur (80-100 mg per dag, meestal in de maagsapresistente vorm) is het best onderbouwd
  - na myocardinfarct wordt hieraan meestal gedurende 12 maanden een P2Y-receptorantagonist geassocieerd (zie 2.1.1.2.)
  - na coronaire stenting wordt hieraan gedurende 3 tot 6 maanden een P2Y-receptorantagonist geassocieerd (zie 2.1.1.2.)
  - na een TIA of mineur CVA wordt hieraan soms in de eerste weken een P2Y-receptorantagonist geassocieerd (zie 2.1.1.2.).
- In *primaire* cardiovasculaire preventie toonden verschillende grote RCT's dat acetylsalicylzuur geen plaats heeft, ook niet bij diabetespatiënten [zie *Folia april 2019*].
- *Preventie van trombo-embolie bij voorkamerfibrillatie*: het nut van monotherapie met acetylsalicylzuur bij laagrisicopatiënten wordt sterk betwijfeld en in de meest recente richtlijnen niet meer aangeraden. De combinatie van acetylsalicylzuur met clopidogrel is minder werkzaam dan de orale anticoagulantia en gaat gepaard met een even hoog bloedingsrisico. Bij voorkamerfibrillatie wordt het dus enkel gebruikt wanneer orale anticoagulantia gecontra-indiceerd zijn of om andere redenen niet wenselijk zijn bij patiënten met een laag bloedingsrisico.
- *Pijnstilling en koortswering*: de plaats van acetylsalicylzuur is heel beperkt. De risico-batenverhouding in deze indicaties is minder gunstig dan deze van paracetamol (zie 8.1.).
- Bij zwangere vrouwen met hoog risico van pre-eclampsie wordt acetylsalicylzuur in lage dosis (< 100 mg p.d.) preventief gebruikt (zie rubriek "*Zwangerschap en borstvoeding*"). Deze indicatie is niet opgenomen in de SKP.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Acuut myocardinfarct en instabiele angor.
- Acuut ischemisch cerebrovasculair accident bevestigd door beeldvorming.



- Secundaire preventie bij volgende patiëntengroepen:
  - patiënten met stabiele angor;
  - patiënten met vroeger doorgemaakt myocardinfarct;
  - patiënten met vroeger doorgemaakt TIA of ischemisch CVA;
  - patiënten met perifeer vaatlijden;
  - patiënten die coronaire of perifere angioplastie of revascularisatiechirurgie hebben ondergaan.

## Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- (Voorgeschiedenis van) gastro-duodenaal ulcus.
- Overgevoeligheid aan salicylaten of andere NSAID's (kruisovergevoeligheid mogelijk).
- Kinderen onder de 12 jaar met virale infectie (vooral influenza en varicella).
- Ernstige nierinsufficiëntie, ernstige leverinsufficiëntie (hoge doses) (SKP).

## Ongewenste effecten

- Bloeding: ook met laaggedoseerd acetylsalicylzuur kunnen bloedingsproblemen zoals nabloeding bij tandextractie, gastro-intestinale of centrale bloedingen optreden, soms reeds na een éénmalige dosis.
- Lokaal etsend effect op de maagmucosa, zelfs bij lage dosis, met soms ernstige maagbloeding; dit risico is geringer met oplosbare acetylsalicylzuurpreparaten en maagsapresistente vormen. Maagbescherming met een PPI wordt voorgesteld bij personen ouder dan 80 jaar en bij risicopatiënten (zie 3.1).
- Overgevoeligheidsreacties (bv. bronchospasme), vooral bij patiënten met astma en nasale poliepen; er is kruisovergevoeligheid met de NSAID's.
- Mogelijk risico van syndroom van Reye [zie *Folia maart 2003* en *Folia september 2003*].

## Zwangerschap en borstvoeding

- **Acetylsalicylzuur wordt best vermeden tijdens de zwangerschap:**
  - **Eerste trimester: vermoeden van een teratogeen en abortief effect bij gebruik van hoge doses.**
  - **Derde trimester: risico van verlengde zwangerschap en arbeid, en van vervroegde sluiting van de ductus arteriosus bij chronisch gebruik van hoge doses.**
  - **Perinataal: risico van bloedingen bij moeder, foetus en pasgeborene.**
- Gebruik van acetylsalicylzuur in lage dosis (< 100 mg p.d.) vanaf het einde van het eerste trimester kan nuttig zijn bij vrouwen met hoog risico van pre-eclampsie; er wordt aanbevolen om de inname van acetylsalicylzuur 5 à 10 dagen vóór de geplande bevallingsdatum te stoppen [zie *Folia april 2016*].
- Borstvoeding: er zijn geen gegevens met lage doses; gebruik van hoge doses acetylsalicylzuur tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding, in het bijzonder gastro-intestinale bloeding, bij associëren met antitrombotische middelen, NSAID's (inclusief de COX-2-selectieve), SSRI's of serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Verhoogd risico van gastro-intestinale letsels bij gelijktijdig gebruik van NSAID's. Het gastro-intestinale voordeel van de COX-2-selectieve NSAID's verdwijnt grotendeels bij associatie met acetylsalicylzuur.
- Associëren van acetylsalicylzuur en NSAID's (indometacine, ibuprofen, naproxen): vermoeden van verminderen van het cardioprotectief effect van acetylsalicylzuur. Bij ibuprofen zou het cardioprotectief effect van acetylsalicylzuur kunnen behouden blijven door ibuprofen enkele uren na acetylsalicylzuur toe te dienen.
- Associëren van (vooral hoge doses van) acetylsalicylzuur en methotrexaat: verhoogd risico van de ongewenste effecten van methotrexaat, vooral wanneer methotrexaat gebruikt wordt in hoge doses. Bij patiënten met normale nierfunctie op laaggedoseerd methotrexaat is het risico van verhoogde methotrexatoxiciteit door deze interactie zeer laag.



## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Meer kans op bloeding en gastro-intestinale letsels bij gebruik van acetylsalicylzuur in geval van chronisch of overmatig alcoholgebruik

## Posologie

- Acut coronair syndroom (acut myocardinfarct en instabiele angor): 160 à 325 mg zo vlug mogelijk na de eerste symptomen en bij voorkeur in een oplosbare vorm, nadien overgaan tot secundaire preventie (80 à 100 mg p.d.).
- Acute fase van het ischemisch cerebrovasculair accident (na uitsluiten van cerebrale bloeding): eerste dosis van 160 à 325 mg, gevolgd door 80 à 100 mg per dag.
- Preventie: 80 à 100 mg per dag.


## Niet-maagsapresistente preparaten

### ASPIRINE (Bayer)




acetylsalicylzuur  
oplosb. tabl.  
30 x 100 mg 4,56 €

## Maagsapresistente preparaten

### ASA EG (EG)

acetylsalicylzuur  
maagsapresist. tabl.  
100 x 100 mg b  8,19 €

### ASAFLOW (Orifarm Healthcare)

acetylsalicylzuur  
maagsapresist. tabl.  
56 x 80 mg b  7,47 €  
112 x 80 mg b  8,51 €  
168 x 80 mg b  10,06 €  
168 x 80 mg 5,71 €  
56 x 160 mg 10,80 €

(de verpakking van 168 x 80 mg is beschikbaar in blister en in tablettencontainer)

### CARDIOASPIRINE (Bayer)

acetylsalicylzuur  
maagsapresist. tabl.  
56 x 100 mg 7,96 €  
84 x 100 mg 11,94 €



## 2.1.1.2. P2Y-receptorantagonisten

### 2.1.1.2.1. Thiënoopyridines

Clopidogrel, prasugrel en ticlopidine zijn irreversibele P2Y-receptorantagonisten die interfereren met de plaatjesactivatie. Clopidogrel en prasugrel zijn prodrugs die in de lever omgezet worden tot een actieve metaboliet.

#### Plaatsbepaling

- Clopidogrel in monotherapie wordt in de secundaire cardiovasculaire preventie enkel gebruikt wanneer acetylsalicylzuur gecontra-indiceerd is of niet verdragen wordt, maar werd niet specifiek bestudeerd in deze populaties.
- Clopidogrel en prasugrel hebben een plaats in de acute fase van een coronair syndroom.
- Clopidogrel en prasugrel hebben in combinatie met acetylsalicylzuur een plaats na stenting (3-6 maanden) en na acuut coronair syndroom (meestal 12 maanden). Na deze termijn is er geen bewijs dat het toegenomen bloedingsrisico opweegt tegen de mogelijke winst. Er is geen bewijs dat de risico-batenbalans van prasugrel beter is dan die van clopidogrel (prasugrel is doeltreffender dan clopidogrel, maar gaat gepaard met een hoger bloedingsrisico) [zie *Folia januari 2016*].
- Clopidogrel + acetylsalicylzuur wordt voorgesteld in de periode kort na een doorgemaakt TIA of mineur CVA [zie *Folia juli 2019*].
- Voor de preventie van trombo-embolie bij voorkamerfibrillatie is de combinatie van clopidogrel met acetylsalicylzuur minder werkzaam dan de orale anticoagulantia en gaat gepaard met een even hoog bloedingsrisico. Ze wordt dus enkel gebruikt bij voorkamerfibrillatie wanneer orale anticoagulantia gecontra-indiceerd zijn of om andere redenen niet wenselijk zijn bij patiënten met een laag bloedingsrisico.
- Ticlopidine heeft slechts een zeer beperkte plaats, o.a. wegens zijn hematologische ongewenste effecten.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Clopidogrel:
  - in monotherapie (zie rubriek "Plaatsbepaling"):
    - na een myocardinfarct;
    - na een ischemisch cerebrovasculair accident;
    - bij patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening.
  - in associatie met acetylsalicylzuur:
    - acuut coronair syndroom;
    - na electieve PTCA;
    - de eerste 3 weken na TIA of mineur CVA;
    - bij voorkamerfibrillatie: preventie van arteriële trombo-embolische events bij patiënten met laag bloedingsrisico die niet kunnen behandeld worden met orale anticoagulantia (zie rubriek "Plaatsbepaling").
- Prasugrel (altijd in associatie met acetylsalicylzuur): acuut coronair syndroom met percutane coronaire angioplastie.
- Ticlopidine: preventie van arteriële trombo-embolische events bij bv. coronaire en perifere angioplastie, en sommige types hemodialyse (zie rubriek "Plaatsbepaling").

#### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Prasugrel: ook antecedenten van CVA of TIA.
- Ticlopidine: ook antecedenten van leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, trombocytopenische purpura.



- Clopidogrel, prasugrel: ook ernstige leverinsufficiëntie (SKP). Clopidogrel wordt op de website <https://www.genesmiddelenbijlevercirrose.nl> als “onveilig” (te vermijden) bij levercirrose beoordeeld.

## Ongewenste effecten

- Bloeding (groter risico met prasugrel dan met clopidogrel).
- Hematologische toxiciteit, vooral met ticlopidine, minder met clopidogrel en prasugrel: beenmergdepressie (vooral neutropenie), trombotische trombocytopenische purpura.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van thiënoprydines met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Clopidogrel (prodrug) is een substraat van CYP2C19, CYP3A4 en P-gp, en een inhibitor van CYP2B6 en CYP2C8 (zie *Tabel Ic. in Inl.6.3.* en *Tabel Id. in Inl.6.3.*). De omzetting van clopidogrel tot zijn actieve metaboliet kan geremd worden door protonpompinhibitoren (vooral omeprazol, esomeprazol en in mindere mate lansoprazol), met vermindering van het antiaggregerend effect en verhoogd risico van cardiovasculaire events. Als het samen geven van clopidogrel met een PPI essentieel is, lijkt het voorzichtiger omeprazol en esomeprazol te vermijden.
- Ticlopidine is een substraat van CYP2C19 en CYP3A4 en een inhibitor van CYP1A2, CYP2B6 en CYP2C19 (zie *Tabel Ic. in Inl.6.3.*).

## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Clopidogrel is een prodrug die gedeeltelijk via CYP2C19 omgezet wordt naar een actieve metaboliet. Bij patiënten met een verminderd CYP2C19-metabolisme (door CYP2C19-polymorfisme) wordt minder actieve metaboliet gevormd en kan het effect op de plaatjesfunctie verminderd zijn.
- Ticlopidine: regelmatige controle van het bloedbeeld is nodig.

## Clopidogrel

*Posol.*

preventie: 75 mg p.d. in 1 dosis (bij acute coronaire syndromen: eventueel eenmalige ladingsdosis van 300 à 600 mg)

**CLOPIDOGREL AB (Aurobindo)**

clopidogrel (waterstofsulfaat)  
filmomh. tabl.

- 28 x 75 mg R/ b € 8,48
- 98 x 75 mg R/ b € 16,33

**CLOPIDOGREL EG (EG)**

clopidogrel (besilaat)  
filmomh. tabl.

- 28 x 75 mg R/ b € 8,48
- 98 x 75 mg R/ b € 16,33

**CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ**  
(Sandoz)

clopidogrel (hydrochloride)  
filmomh. tabl.

- 28 x 75 mg R/ b € 8,48
- 84 x 75 mg R/ b € 14,73
- 98 x 75 mg R/ b € 16,33

**CLOPIDOGREL KRKA (KRKA)**

clopidogrel (hydrochloride)  
filmomh. tabl.

- 28 x 75 mg R/ b € 8,48
- 84 x 75 mg R/ b € 14,77
- 100 x 75 mg R/ b € 16,58

**CLOPIDOGREL TEVA (Teva)**

clopidogrel (waterstofsulfaat)  
filmomh. tabl.

- 100 x 75 mg R/ b € 16,53

**CLOPIDOGREL VIATRIS (Viatris)**

clopidogrel (besilaat)  
filmomh. tabl.

- 30 x 75 mg R/ b € 8,69
- 90 x 75 mg R/ b € 15,40

**PLAVIX (Sanofi Belgium)**

clopidogrel (waterstofsulfaat)  
filmomh. tabl.

- 30 x 300 mg U.H. [43 €]



## Prasugrel

### Posol.

5 à 10 mg p.d. in 1 dosis; bij patiënten ouder dan 75 jaar en patiënten die minder dan 60 kg wegen: 5 mg p.d.

### EFIENT (Substipharma)

prasugrel (hydrochloride)  
filmomh. tabl.

- 28 x 5 mg R/ b 28,47 €
- 28 x 10 mg R/ b 28,47 €
- 84 x 10 mg R/ b 70,57 €

### EFIENT (PI-Pharma)

prasugrel (hydrochloride)  
filmomh. tabl.

- 84 x 10 mg R/ b 70,57 €  
(parallele distributie)

## Ticlopidine

### TICLID (Eurocept)

ticlopidine, hydrochloride  
filmomh. tabl.

- 60 x 250 mg R/ a 23,18 €

### TICLID (Impexeco)

ticlopidine, hydrochloride  
filmomh. tabl.

- 60 x 250 mg R/ a 23,18 €  
(parallelinvoer)

### TICLOPIDINE TEVA (Teva)

ticlopidine, hydrochloride  
filmomh. tabl.

- 90 x 250 mg R/ a 27,91 €

## 2.1.1.2.2. Reversibele P2Y-receptorantagonisten

Cangrelor en ticagrelor zijn antiaggregantia, chemisch verwant aan adenosine. Het zijn directe (geen prodrugs) en reversibele P2Y-receptorantagonisten.

### Plaatsbepaling

- De plaats van ticagrelor ten opzichte van de andere antiaggregantia gebruikt bij coronairlijden, is niet duidelijk. Het werd vooral bestudeerd bij acuut coronair syndroom met stenting.
- Cangrelor wordt intraveneus toegediend en is dus een alternatief voor de perorale P2Y-receptorantagonisten wanneer perorale toediening onmogelijk is, maar heeft daarnaast geen duidelijke meerwaarde ten opzichte van clopidogrel: cangrelor is niet doeltreffender en het is veel duurder [zie Folia maart 2019].

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Cangrelor: verminderen van trombotische cardiovasculaire events tijdens percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur, bij patiënten die vóór deze interventie geen orale P2Y-receptorantagonist kregen toegediend en bij wie de orale toediening ervan niet mogelijk of niet wenselijk is.
- Ticagrelor: preventie van arteriële trombo-embolische aandoeningen, altijd in associatie met acetylsalicylzuur bij patiënten
  - met acuut coronair syndroom;
  - met myocardinfarct in de voorgeschiedenis en verhoogd trombo-embolisch risico.

### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.





- Cangrelor: ook antecedent van CVA of TIA.
- Ticagrelor: ook antecedenten van intracranieële bloeding en ernstige leverinsufficiëntie (SKP).

## Ongewenste effecten

- Bloeding (groter risico dan met clopidogrel).
- Dyspneu.
- Hartgeleidingsstoornissen (met ventriculaire pauzes, vooral bij de start van de behandeling).
- Zelden: overgevoeligheidsreacties.
- Ticagrelor: ook hoofdpijn, hyperuricemie.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Cangrelor mag niet gelijktijdig met clopidogrel toegediend worden omdat cangrelor het antiaggregerend effect van clopidogrel vermindert.
- Ticagrelor is een substraat en inhibitor van CYP3A4 en een substraat en inhibitor van P-gp (zie Tabel Ic. in Inl.6.3. en Tabel Id. in Inl.6.3.).

## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met risico van bradycardie en bij patiënten met astma of COPD.

## Cangrelor

*KENGREXAL (Chiesi)*

cangrelor (natrium)

inj./inf. oploss. conc. (pdr.) i.v. [flac.]

10 x 50 mg U.H. [2.968 €]

## Ticagrelor

*Posol.*

- acuut coronair syndroom: 180 mg p.d. in 2 doses (na eenmalige oplaaddosis van 180 mg)

- myocardinfarct in de voorgeschiedenis: 120 mg p.d. in 2 doses\*

\* met de huidige in België beschikbare specialiteit is het niet meer mogelijk de posologie voor deze indicatie te bekomen

*BRILIQUE (AstraZeneca)*

ticagrelor

filmomh. tabl.

56 x 90 mg R/ b<sup>†</sup> ○ 75,25 €

168 x 90 mg R/ b<sup>†</sup> ○ 204,75 €

orodisp. tabl.

10 x 90 mg U.H. [11 €]

### 2.1.1.3. Dipyridamol

Dipyridamol verhindert de heropname van adenosine in de bloedplaatjes en remt zo de plaatjesaggregatie. Dipyridamol is niet meer beschikbaar sinds november 2022.



## Plaatsbepaling

- Voor dipyridamol in monotherapie is de evidentie van doeltreffendheid in de cardiovasculaire preventie zeer zwak.

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Preventie van trombo-embolische complicaties bij klepprothesen, in combinatie met een vitamine K-antagonist.

## Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, warmte-opwellingen, hypotensie.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van dipyridamol met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Verhoogd effect van adenosine door dipyridamol: dosisreductie van adenosine is nodig.

## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: *zie 2.1.*
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.

De specialiteit **Dipyridamole EG®** is niet meer op de markt sinds november 2022.

*Posol.*

preventie bij klepprothesen: 300 à 450 mg p.d. in meerdere doses, in combinatie met een vitamine K-antagonist

### 2.1.1.4. Epoprostenol

Epoprostenol is een natuurlijk prostaglandine (PGI<sub>2</sub>), een type prostaglandine dat wordt gevormd in de vaatwand. Het heeft in tegenstelling tot andere prostaglandines, een krachtige dosisafhankelijke trombocytenuitremmende en vasodilaterende werking.

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Bij hemodialyse, in noodsituaties, wanneer het gebruik van heparine gepaard zou gaan met een te hoog bloedingsrisico of gecontra-indiceerd is.
- Pulmonale hypertensie.

## Contra-indicaties

- Ernstige linkerventrikeldisfunctie.

## Ongewenste effecten

- Bloeding, trombocytopenie.
- Warmte-opwellingen, hoofdpijn, gastro-intestinale stoornissen, pijn ter hoogte van de kaak.
- Hypotensie, brady- en tachycardie.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van



epoprostenol met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

#### *FLOLAN (GSK)*

epoprostenol (natrium)

inf. oplossing. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac., thermostabiele formule]

1 x 0,5 mg + 50 ml solv. U.H. [43 €]

inf. oplossing. (pdr. + solv.) i.v. [3x flac., thermostabiele formule]

1 x 1,5 mg + 2x 50 ml solv. U.H. [54 €]

(weesgeneesmiddel)

#### *VELETRI (Janssen-Cilag)*

epoprostenol (natrium)

inf. oplossing. conc. (pdr.) i.v. [flac.]

1 x 0,5 mg U.H. [43 €]

1 x 1,5 mg U.H. [54 €]

### 2.1.1.5. Antagonisten van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren

Eptifibatide en tirofiban zijn antagonisten van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren die een rol spelen bij de bloedplaatjesaggregatie.

#### **Indicaties (synthese van de SKP)**

- Vroegtijdige behandeling bij patiënten met instabiele angor en infarct zonder ST-elevatie ter preventie van ontwikkeling van infarct.

#### **Contra-indicaties**

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Eptifibatide: ook ernstige nierinsufficiëntie; ernstige leverinsufficiëntie (SKP).

#### **Ongewenste effecten**

- Bloeding.
- Trombocytopenie.
- Zelden: overgevoelighedsreacties.

#### **Interacties**

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van antagonisten van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

#### **Eptifibatide**

De specialiteit **Integrilin**® is niet meer op de markt sinds februari 2024.

#### **Tirofiban**

#### *AGGRASTAT (Correvio)*

tirofiban (hydrochloride)

inf. oplossing. i.v. [zak]

1 x 250 ml 0,05 mg / 1 ml U.H. [156 €]

inf. oplossing. (conc.) i.v. [flac.]



1 x 50 ml 0,25 mg / 1 ml U.H. [156 €]

## 2.1.2. Anticoagulantia

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:

- de orale anticoagulantia:
  - vitamine K-antagonisten
  - directe orale anticoagulantia (DOAC's)
- de parenterale anticoagulantia:
  - heparines: niet gefractioneerde heparines, heparines met laag moleculair gewicht en heparinoïden
  - bivalirudine
  - fondaparinux
  - proteïne C
  - antitrombine.

### Plaatsbepaling

- De voordelen van een antistollingsbehandeling moeten altijd afgewogen worden tegen het bloedingsrisico.
- *Preventie en behandeling van arteriële trombo-embolie:*
  - Behandeling in de acute fase van een acuut coronair syndroom (bepaalde parenterale anticoagulantia).
  - Preventie bij klepprothesen en hartkleplijden: bij mechanische hartklepprothesen en matig ernstige tot ernstige mitraalstenose zijn DOAC's gecontra-indiceerd en blijven vitamine K-antagonisten de enige optie. In de eerste 3 maanden na plaatsing van een bioprothetische klep is onduidelijk of DOAC's even goed beschermen als vitamine K-antagonisten. Bij patiënten met kleplijden anders dan mitraalstenose of meer dan 3 maanden na de plaatsing van een bioprothetische klep worden de DOAC's in de meest recente richtlijnen wel gezien als een goed alternatief voor vitamine K-antagonisten indien er een indicatie is voor een anticoagulerende behandeling.
  - Preventie bij patiënten met voorkamerfibrillatie: bij voorkamerfibrillatie (VKF) is de antitrombotische benadering minstens even belangrijk als de benadering van het ritmeprobleem (*zie 1.8.*). Vitamine K-antagonisten en DOAC's kunnen gebruikt worden, met vergelijkbare werkzaamheid en veiligheid [*zie Folia januari 2020*]. Bij sommige patiënten met een laag tromboserisico kan de antitrombotische behandeling evenwel achterwege gelaten worden omdat de voordelen ervan niet opwegen tegen de nadelen. Om het tromboserisico in te schatten bij VKF bestaan verschillende schalen waaronder het veel gebruikte CHADS-VASc [*zie Folia maart 2012*]; voor het bloedingsrisico wordt vaak de HAS-BLED schaal gebruikt.
- Bij *preventie van diepe veneuze trombose* worden heparines met laag moleculair gewicht, vitamine K-antagonisten of directe orale anticoagulantia (DOAC's) gegeven. Het nut van anticoagulatie staat vast bij de preventie in hoogrisicosituaties (bv. majeure orthopedische, abdominale of pelvische chirurgie). Voor wat betreft preventie bij minder risicovolle situaties (bv. bedlegerige patiënten) moet een risico-batenafweging gemaakt worden.
- Bij *behandeling van diepe veneuze trombose en longembool* worden initieel heparines met laag moleculair gewicht of directe orale anticoagulantia (DOAC's) gegeven: hun werkzaamheid en veiligheid zijn vergelijkbaar. Enkel de DOAC's apixaban en rivaroxaban zijn in deze indicatie onderzocht als initiële behandeling; dabigatran en edoxaban werden enkel onderzocht na een initiële behandeling met LMWH's. Voortzetting van de behandeling gedurende enkele maanden gebeurt met vitamine K-antagonisten of DOAC's. In sommige gevallen (contra-indicaties voor vitamine K-antagonisten én DOAC's, zwangerschap, patiënten met kanker) kan de behandeling ook worden voortgezet met LMWH's.
- Het niet kunnen monitoren van een behandeling met DOAC's (vooral bij patiënten met nierinsufficiëntie), het ontbreken van een antidotum voor sommige en de veel hogere kostprijs moeten afgewogen worden



tegen het grotere gebruiksgemak van de DOAC's vergeleken met vitamine K-antagonisten [zie *Folia januari 2017 en Folia januari 2020*].

- Niet-gefractioneerde (klassieke) heparine wordt nog gebruikt voor acute anticoagulatie in sommige gevallen (bv. bij hemodynamische instabiliteit, zeer groot bloedingsrisico, ernstige nierinsufficiëntie).
- De plaats van danaparoïde, fondaparinux en bivaluridine is beperkt tot acute situaties of bij patiënten waarbij de gangbare therapie niet geschikt is.

### 2.1.2.1. Orale anticoagulantia

#### 2.1.2.1.1. Vitamine K-antagonisten

De vitamine K-antagonisten (coumarine-anticoagulantia) inhiberen t.h.v. de lever de synthese van de stollingsfactoren II (protrombine), VII, IX en X, en van de stollingsinhibitoren proteïne C en proteïne S.

##### **Tabel 2a. INVLOED VAN GENEESMIDDELEN OP HET EFFECT VAN DE VITAMINE K-ANTAGONISTEN**

De meeste informatie is afkomstig van observaties met warfarine, maar er wordt verondersteld dat de waarschuwing ook geldt voor de andere vitamine K-antagonisten. Wanneer hieronder een klasse wordt vermeld, worden de geneesmiddelen behorend tot deze klasse niet apart vermeld.

##### TOENAME OF DALING VAN HET EFFECT

Werd beschreven met volgende middelen en klassen:

- *Antitumorale middelen* (zie [www.cancer-druginteractions.org](http://www.cancer-druginteractions.org))
- Fenytoïne
- *Middelen bij chronische hepatitis C* (zie [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org))
- *Middelen tegen retrovirussen (HIV)* (zie [www.hiv-druginteractions.org](http://www.hiv-druginteractions.org))

##### TOENAME VAN HET EFFECT

Werd beschreven met volgende middelen en klassen:

- Acetylsalicylzuur
- Amiodaron
- *Androgenen en anabole steroïden*
- *Antibiotica*
- *Andere antitrombotica (antiaggregantia, anticoagulantia, trombolytica)*
- Capecitabine
- *Cefalosporines (vooral cefazoline)*
- Cimetidine
- *Corticosteroiden (vooral bij systemisch gebruik van hoge doses)*
- Co-trimoxazol
- Deferasirox
- Disulfiram
- *Fibraten*
- Fluconazol
- Fluorouracil
- Itraconazol
- Leflunomide
- Levothyroxine
- Metronidazol (wellicht ook met ornidazol)
- Miconazol (alle toedieningsvormen)
- Noscapine
- *NSAID's*
- Omega-3-vetzuren (vooral hoge doses)
- Orlistat
- Piroxicam



- Propafenon
- *SSRI's en SNRI's*
- *Statines (vooral rosuvastatine)*
- Sulfamethoxazol
- Tamoxifen
- Tegafur
- Tibolon
- Voriconazol
- Vortioxetine

#### DALING VAN HET EFFECT

Werd beschreven met volgende middelen:

- Aprepitant
- Azathioprine
- Bosentan
- Carbamazepine
- Colestyramine
- Enzalutamide
- Fenobarbital
- Fosaprepitant
- Letermovir
- Mercaptopurine
- Primidon
- Propylthiouracil
- Rifampicine (mogelijk ook met rifabutine, rifamycine en rifaximine)
- Sigarettenrook
- Sint-janskruid
- Teriflunomide
- Thiamazol
- Vitamine K

### Plaatsbepaling

- *Zie 2.1.2.*
- De vitamine K-antagonisten blijven de enige optie bij mechanische klepprothesen, in de eerste 3 maanden na plaatsing van een bioprothetische klep en bij patiënten met VKF met matig tot ernstige mitraalstenose. Ook bij patiënten met antifosfolipidensyndroom zijn ze de enige optie.
- De vitamine K-antagonisten blijven eveneens een goed onderbouwde behandeling bij heel wat patiënten wanneer langdurige orale anticoagulatie gewenst is [*Folia januari 2017 en Folia januari 2020*]. De verlenging van de protrombinetijd is een maat voor het effect van vitamine K-antagonisten, en wordt uitgedrukt als *International Normalized Ratio* (INR).
- De vitamine K-antagonisten beschikbaar in België zijn acenocoumarol (halfwaardetijd van 8 uur, overeenkomend met een antistolling van 48 uur na de laatste inname), warfarine (halfwaardetijd van 20 à 60 uur, overeenkomend met een antistolling van 2 à 5 dagen na de laatste inname) en fenprocoumon (halfwaardetijd van 140 à 160 uur, overeenkomend met een antistolling van 1 à 2 weken na de laatste inname).
- De vitamine K-antagonisten met lange halfwaardetijd geven een meer stabiele anticoagulatie.
- Warfarine is de best bestudeerde vitamine K-antagonist.
- Dikwijls worden vitamine K-antagonisten reeds gestart tijdens de heparinetherapie, en wordt heparine gedurende enkele dagen voortgezet tot de gewenste INR is bereikt.



## Indicaties (synthese van de SKP)

- Behandeling en preventie van trombo-embolische aandoeningen, zoals bij diepe veneuze trombose en longembolus, aansluitend op de initiële behandeling met heparine.
- Hartkleprothesen.
- Voorkamerfibrillatie: in secundaire preventie (na doorgemaakt TIA of CVA), en bij de meeste patiënten ook in primaire preventie [zie *Transparantiefiche "Voorkamerfibrillatie" en Folia januari 2017*].

## Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Acute bacteriële endocarditis.
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Diabetische retinopathie.
- **Zwangerschap (vooral eerste trimester en einde van de zwangerschap).**
- Acenocoumarol en warfarine: ernstige nierinsufficiëntie, ernstige leverinsufficiëntie (SKP).

## Ongewenste effecten

- **De vitamine K-antagonisten zijn geneesmiddelen met een nauwe therapeutisch-toxische marge.**
- Bloeding.
- Tijdelijke verhoging van de leverenzymen.
- Zelden: huidnecrose, allergische reacties.

## Zwangerschap en borstvoeding

- **Tijdens de zwangerschap zijn vitamine K-antagonisten gecontra-indiceerd tijdens het eerste trimester (teratogeen effect) en op het einde van de zwangerschap (verhoogd risico van bloedingen bij de moeder en de pasgeborene).** Voor de meeste indicaties heeft overschakelen naar heparines met laag moleculair gewicht de voorkeur, maar als tromboprophylaxe bij vrouwen met kunsthartkleppen zijn deze onvoldoende onderzocht. Op strikte indicatie (vrouwen met kunsthartkleppen) kunnen vitamine K-antagonisten gedurende de hele zwangerschap voortgezet worden; volgens sommige bronnen gaat de voorkeur dan uit naar acenocoumarol.
- Vrouwen van vruchtbare leeftijd die behandeld worden met een vitamine K-antagonist, moeten adequate anticonceptie gebruiken. Bij kinderwens moet dit ruim op voorhand met de behandelende artsen besproken worden zodat een zwangerschapsplan kan opgesteld worden waarin de modaliteiten en timing van het al dan niet overschakelen naar LMWH's en een strikte follow up worden vastgelegd.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van vitamine K-antagonisten met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Bepaalde geneesmiddelen, middelen op basis van planten en voedingsmiddelen kunnen het anticoagulerend effect van de vitamine K-antagonisten beïnvloeden door farmacodynamische of farmacokinetische mechanismen (dit laatste vooral door invloed op hun afbraak).
- De farmacodynamische interacties gelden voor de drie beschikbare vitamine K-antagonisten. De farmacokinetische interacties gelden zeker voor warfarine, dat best bestudeerd is, maar waarschijnlijk ook voor acenocoumarol en fenprocoumon.
- De voornaamste interacties worden vermeld in *Tabel 2a. in 2.1.2.1.1.*
- Bij associëren van eender welk geneesmiddel is voorzichtigheid geboden. Meer frequente meting van de INR nodig, zeker bij associëren van een geneesmiddel vermeld in *Tabel 2a. in 2.1.2.1.1.*
- De vitamine K-antagonisten zijn substraten van CYP2C9; warfarine is daarnaast ook een substraat van CYP1A2 (zie *Tabel 1c. in Inl.6.3.*).



## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Het streefcijfer bij de meeste indicaties is een INR 2 tot 3, bij sommige mechanische hartkleppen 2,5 tot 3,5 [zie *Folia februari 2009*]. De dosering moet aangepast worden in functie van de INR.
- Bij elke wijziging in de behandeling (zeker bij toevoegen of stoppen van een geneesmiddel vermeld in *Tabel 2a. in 2.1.2.1.1.*) bij een patiënt behandeld met een vitamine K-antagonist, moet de INR binnen korte termijn gecontroleerd worden.
- Ouderen zijn gevoeliger voor de vitamine K-antagonisten en het is bij hen moeilijker een stabiele INR te bereiken.
- Bij afwezigheid van leverlijden lijkt beperkt of matig drinken van alcohol het effect van de vitamine K-antagonisten niet te beïnvloeden. Bij chronische, overmatige drinkers kunnen hoger dan verwachte doses vitamine K-antagonist nodig zijn (snellere afbraak in de lever). Bij occasioneel overmatig drinken (binge-drinken) zijn uitgesproken schommelingen in de INR beschreven, zeker bij patiënten met leverinsufficiëntie.
- Sommige patiënten zijn op genetische basis extra gevoelig voor warfarine.
- **Overdosering:**
  - bij INR < 5,0 zonder significante bloeding: de weekdosis verminderen met 10 à 20% (INR-controle na 1 week);
  - bij INR tussen 5,0 en 9,0 zonder significante bloeding:
    - bij gering bloedingsrisico: 1 à 2 doses overslaan; warfarine herstarten aan een 30% lagere dosis eenmaal de INR terug  $\leq$  3,0 (INR-controle elke 2 dagen);
    - bij hoog bloedingsrisico (bv. hoge leeftijd, antecedenten van bloeding): vitamine K-antagonist stoppen en 1 à 2 mg vitamine K per os toedienen (zie 14.2.1.4.); warfarine herstarten aan een 30% lagere dosis eenmaal de INR terug  $\leq$  3,0 (INR-controle elke 2 dagen).
  - bij INR > 9,0 zonder significante bloeding: vitamine K-antagonist stoppen en 2 à 4 mg vitamine K per os toedienen (zie 14.2.1.4.); bijkomend 2 mg vitamine K (per os) toedienen als na 24 uur de INR nog hoger is dan 5,0; warfarine herstarten aan een ten minste 30% lagere dosis eenmaal de INR terug  $\leq$  3,0;
  - bij ernstige bloeding, ongeacht de INR-stijging: dringende ziekenhuisopname, waar vitamine K traag intraveneus toegediend kan worden (5 à 10 mg bij aanvang, te herhalen indien INR na 3 uur onvoldoende gedaald; max 40 mg/24u), bij hoogdringendheid geassocieerd aan toediening van protrombinecomplexconcentraat (PCC, een concentraat van stollingsfactoren II, VII, IX en X) of eventueel vers plasma (geen eerste keuze).

## Posologie

- De dosis van een vitamine K-antagonist nodig om de gewenste graad van antistolling (INR) te bereiken is individueel zeer wisselend.
- Het streefcijfer bij de meeste indicaties is een INR 2 tot 3, bij sommige mechanische hartkleppen 2,5 tot 3,5 [zie *Folia februari 2009*].
- Toediening van een ladingsdosis wordt niet meer toegepast.
- Bij ouderen, bij ondervoeding en bij inname van interagerende medicatie zijn lagere initiële doses aangewezen.

## Acenocoumarol

SINTROM (Merus Labs Luxco)   
acenocoumarol






tabl.

100 x 1 mg R/ b  7,66 €

tabl. (deelb. in 4 niet kwantit.)

20 x 4 mg R/ b  7,21 €

## Fenprocoumon


MARCOUMAR (Viatris) 

fenprocoumon

tabl. (deelb. in 4 kwantit.)


25 x 3 mg R/ b  7,72 €

## Warfarine

MAREVAN (Therabel) 

warfarine, natrium

tabl. (deelb. kwantit.)

60 x 5 mg R/ b  14,65 €

### 2.1.2.1.2. Directe orale anticoagulantia (DOAC's)

Dabigatran, apixaban, edoxaban en rivaroxaban zijn DOAC's. Dabigatran inhibeert rechtstreeks trombine; dabigatran etexilaat is een prodrug die in de lever omgezet wordt tot het actieve dabigatran. Apixaban, edoxaban en rivaroxaban zijn specifieke inhibitoren van factor Xa.

#### Plaatsbepaling

- Zie 2.1.2.
- Rivaroxaban in een lage dosis, geassocieerd aan acetylsalicylzuur, heeft als indicatie de secundaire cardiovasculaire preventie bij patiënten met coronaire hartziekte en/of perifeer arterieel vaatlijden. De risico-batenverhouding in deze indicatie is echter onduidelijk: de winst op vlak van cardiovasculaire morbiditeit is ongeveer even groot als de toename van het bloedingsrisico [zie *Folia mei 2020*].

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Apixaban:
  - Bij volwassenen:
    - preventie van diepe veneuze trombose (DVT) en longembool bij majeure orthopedische chirurgie (heup- of knieprothese);
    - preventie van trombo-embolische events bij patiënten met niet-valvulaire voorkamerfibrillatie (VKF);
    - behandeling en secundaire preventie van DVT en longembool.
- Dabigatran:
  - Bij volwassenen:
    - preventie van DVT en longembool bij majeure orthopedische chirurgie;
    - preventie van trombo-embolische events bij patiënten met niet-valvulaire VKF;
    - behandeling en secundaire preventie van DVT en longembool.
  - Bij kinderen:
    - behandeling en preventie van recidief van veneuze trombo-embolie (VTE).
- Edoxaban:
  - Bij volwassenen:
    - preventie van trombo-embolische events bij patiënten met niet-valvulaire VKF;
    - behandeling en secundaire preventie van diepe veneuze trombose en longembool.



- Rivaroxaban:
  - Bij volwassenen:
    - preventie van DVT en longembool bij majeure orthopedische chirurgie;
    - preventie van trombo-embolische events bij patiënten met niet-valvulaire VKF;
    - behandeling en secundaire preventie van DVT en longembool.
    - Lage dosis (zie rubriek "Plaatsbepaling"):
      - preventie van atherotrombotische complicaties bij patiënten met coronaire hartziekte of symptomatisch perifere arterieel vaatlijden en een hoog risico op ischemische voorvallen (steeds in associatie met acetylsalicylzuur)
      - preventie van atherotrombotische complicaties na een acuut coronair syndroom met verhoogde cardiale biomarkers (steeds in associatie met 1 of meerdere antiaggregantia)
  - Bij kinderen:
    - behandeling en preventie van recidief van veneuze trombo-embolie (VTE).

## Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Mechanische kunstkleppen; gedurende de eerste 3 maanden na plaatsing van een bioprothetische klep.
- Matig ernstige tot ernstige mitraalstenose
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Gebruik bij patiënten met een voorgeschiedenis van trombose gepaard met antifosfolipidensyndroom, wordt afgeraden wegens hoger risico van recidieftrombose dan met vitamine K-antagonisten [zie *Folia januari 2020*].
- Leverlijden met coagulopathie (SKP). Op de website <https://www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl> wordt rivaroxaban als "onveilig" (te vermijden) bij levercirrose (evenwel enkel bij matig ernstige en ernstige cirrose) beoordeeld.
- Dabigatran: ook ernstige nierinsufficiëntie (bij kinderen: eGFR < 50 ml/min/1,73m).

## Ongewenste effecten

- **DOAC's zijn geneesmiddelen met een nauwe therapeutisch-toxische marge.**
- Bloeding: het risico neemt toe bij nierinsufficiëntie.
- Gastro-intestinale stoornissen, verhoging van de leverenzymen.
- Zelden: trombopenie.
- Dabigatran: ook vermoeden van licht verhoogd risico van myocardinfarct; slokdarmletsels indien niet genomen met voldoende water (zelden).
- Inhibitoren van factor Xa: ook huiduitslag.

## Zwangerschap en borstvoeding

- Er is heel weinig bekend over een eventuele nadelige invloed van deze middelen tijdens de zwangerschap en de lactatie; uiterste voorzichtigheid is geboden.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van DOAC's met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Verhoogd risico van gastro-intestinale bloeding bij associëren van DOAC's met orale corticosteroïden.
- Dabigatran is een substraat van P-gp (zie *Tabel Id. in Inl.6.3.*).
- Apixaban is een substraat van CYP3A4 en van P-gp (zie *Tabel Ic. in Inl.6.3. en Tabel Id. in Inl.6.3.*).
- Edoxaban is een substraat van P-gp (zie *Tabel Id. in Inl.6.3.*).
- Rivaroxaban is een substraat van CYP3A4 en van P-gp (zie *Tabel Ic. en Tabel Id. in Inl.6.3.*).



## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- De nierfunctie controleren voor de start van de behandeling en op regelmatige tijdstippen bij patiënten ouder dan 75 jaar of bij elk vermoeden van vermindering van de nierfunctie, ongeacht de leeftijd van de patiënt.
- Dosisaanpassing wordt aanbevolen in functie van nierfunctie, leeftijd en soms ook lichaamsgewicht of comedatie; dit verschilt volgens product. Dosisverlaging buiten deze criteria dient vermeden te worden omwille van het risico op onderbehandeling [zie *Folia december 2017* en *Folia juni 2020*].
- Bij de overgang van gefractioneerde heparines naar DOAC's moet de heparine onmiddellijk gestopt worden (geen overlapperiode).
- Bij ernstige bloeding kunnen in het ziekenhuis vers plasma of concentraten van stollingsfactoren toegediend worden. Als antidotum voor dabigatran wordt idarucizumab, een monokonaal antilichaam, gebruikt (zie 20.1.1.4. en *Folia mei 2016*). Als antidotum voor apixaban en rivaroxaban wordt andexanet alfa, een recombinante en geïnactieveerde stollingsfactor Xa, gebruikt (zie 20.1.1.5.). Superioriteit van deze specifieke antidota ten opzichte van concentraten van stollingsfactoren is niet aangetoond.
- Monitoring van het effect van de anticoagulerende behandeling (bepaling van anti-Xa activiteit) is mogelijk, maar routine monitoring is volgens de richtlijnen niet noodzakelijk. De kostprijs is veel hoger dan een INR-bepaling en terugbetaling is in België slechts voorzien in bepaalde situaties.
- Dabigatran:
  - voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ischemisch hartlijden;
  - voor een goede opname van het geneesmiddel en ter preventie van slokdarmletsels, moeten de capsules in hun geheel ingenomen worden met voldoende water;
  - bij kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zowel de capsules als het granulaat worden gebruikt; wegens verschillen in biologische beschikbaarheid is de posologie voor beide vormen niet dezelfde: het is aangewezen de respectievelijke SKP's te raadplegen voor de correcte posologie, zeker bij overschakelen tussen beide vormen.
- Rivaroxaban innemen samen met voedsel, zeker bij dosissen  $\geq 15$  mg, om een hogere biologische beschikbaarheid te bekomen.

## Apixaban

### Posol.

- primaire preventie van DVT na electieve plaatsing van een totale knie- of heupprothese: 5 mg p.d. in 2 doses gedurende 10-14 dagen (knie) of 32-38 dagen (heup)
- trombo-embolische preventie bij voorkamerfibrillatie:
  - behandeling van DVT en longembool: 20 mg p.d. in 2 doses gedurende 7 dagen, nadien 10 mg p.d. in 2 doses gedurende 3 tot 6 maanden
  - secundaire preventie van DVT en longembool (indien geïndiceerd, na behandeling van 6 maanden voor DVT of longembool): 5 mg p.d. in 2 doses

ELIQUIS (Bristol-Myers Squibb)

apixaban

filmomh. tabl.

- 20 x 2,5 mg R/ b 50,72 €
- 60 x 2,5 mg R/ b 84,56 €
- 168 x 2,5 mg R/ b 217,71 €
- 56 x 5 mg R/ b 79,62 €

168 x 5 mg R/ b 217,71 €

(parallele distributie)

ELIQUIS (Abacus)

apixaban

filmomh. tabl.

- 168 x 2,5 mg R/
- 168 x 5 mg R/

ELIQUIS (Orifarm Belgium)

apixaban

filmomh. tabl.

- 168 x 2,5 mg R/
- 168 x 5 mg R/

(parallele distributie)



## Dabigatran

*Posol.*

- primaire preventie van DVT na electieve plaatsing van een totale knie- of heupprothese:
- trombo-embolische preventie bij voorkamerfibrillatie:
- behandeling en secundaire preventie van DVT en longembool (na een parenterale anticoagulerende behandeling gedurende minstens 5 dagen):

**PRADAXA (Boehringer Ingelheim)**

dabigatran, etexilaat [onder de vorm van mesilaat]  
harde caps.

- 10 x 75 mg R/ b 13,33 €
- 60 x 75 mg R/ b 49,44 €
- 10 x 110 mg R/ b 13,33 €
- 60 x 110 mg R/ b 49,44 €
- 180 x 110 mg R/ b 130,72 €
- 60 x 150 mg R/ b 49,44 €
- 180 x 150 mg R/ b 130,72 €

omh. gran. (zakjes)

- 60 x 20 mg R/ 294,02 €
- 60 x 30 mg R/ 294,02 €
- 60 x 40 mg R/ 294,02 €
- 60 x 50 mg R/ 294,02 €
- 60 x 110 mg R/ 294,02 €
- 60 x 150 mg R/ 294,02 €

**PRADAXA (Abacus)**

dabigatran, etexilaat [onder de vorm van mesilaat]  
harde caps.

- 180 x 150 mg R/ 130,23 €

(parallele distributie)

## Edoxaban

*Posol.*

- trombo-embolische preventie bij voorkamerfibrillatie:
- behandeling en secundaire preventie van DVT en longembool (na een parenterale anticoagulerende behandeling gedurende minstens 5 dagen):

**LIXIANA (Daiichi Sankyo)**

edoxaban (tosilaat)

filmomh. tabl.

- 10 x 15 mg R/ b 33,32 €
- 28 x 30 mg R/ b 79,60 €
- 98 x 30 mg R/ b 252,13 €
- 28 x 60 mg R/ b 79,60 €
- 98 x 60 mg R/ b 252,13 €

## Rivaroxaban

*Posol.*



- primaire preventie van DVT na electieve plaatsing van een totale knie- of heupprothese: 10 mg p.d. in 1 dosis gedurende 2 weken (knie) of 5 weken (heup)
- trombo-embolische preventie bij voorkamerfibrillatie:
- behandeling van DVT en longembool: 30 mg p.d. in 2 doses gedurende 21 dagen, gevolgd door:
- secundaire preventie van DVT en longembool (indien geïndiceerd na behandeling van ten minste 6 maanden voor DVT of longembool): 10 mg p.d. in 1 dosis; 20 mg p.d. in 1 dosis bij hoog risico op recidief
- secundaire cardiovasculaire preventie bij specifieke doelgroepen (in associatie met acetylsalicylzuur): 5 mg p.d. in 2 doses

#### RIVAROXABAN SANDOZ (Sandoz)

rivaroxaban  
filmomh. tabl.

- 56 x 2,5 mg R/ b 29,02 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 82,48 €

#### RIVAROXABAN VIATRIS (Viartis)

rivaroxaban  
filmomh. tabl.

- 56 x 2,5 mg R/ b 29,02 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 82,48 €

#### XARELTO (Bayer)

rivaroxaban  
filmomh. tabl.

- 56 x 2,5 mg R/ b 70,76 €
- 196 x 2,5 mg R/ b 222,07 €
- 10 x 10 mg R/ b 34,57 €
- 30 x 10 mg R/ b 88,16 €
- 98 x 10 mg R/ b 231,74 €
- 28 x 15 mg R/ b 73,64 €
- 42 x 15 mg R/ b 105,36 €

- 98 x 15 mg R/ b 231,74 €
- 28 x 20 mg R/ b 73,64 €
- 98 x 20 mg R/ b 231,74 €
- susp. (gran.)
- 1 x 51,7 mg R/ 18,21 €
- 1 x 103,4 mg R/ 32,03 €

#### XARELTO (Abacus)

rivaroxaban  
filmomh. tabl.  
98 x 15 mg R/  
(parallele distributie)

## 2.1.2.2. Parenterale anticoagulantia

### 2.1.2.2.1. Heparines

#### 2.1.2.2.1.1. Niet-gefractioneerde heparines

#### Plaatsbepaling

- Zie 2.1.2.
- Niet-gefractioneerde (klassieke) heparines worden steeds minder gebruikt voor de preventie van veneuze trombo-embolie.
- Niet-gefractioneerde (klassieke) heparines worden nog gebruikt voor acute anticoagulatie in sommige gevallen (bv. bij hemodynamische instabiliteit, zeer groot bloedingsrisico, ernstige nierinsufficiëntie). Ze hebben het voordeel dat hun effect snel reversibel is en dat ze niet via de nier uitgescheiden worden.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Behandeling van longembool en van diepe veneuze trombose; ook preventief bij bepaalde chirurgische ingrepen.
- Acuut myocardinfarct, instabiele angor.
- Preventie van trombose ter hoogte van een centrale lijn en bij extracorporale circulatie, bv. bij dialyse.

#### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Toediening van therapeutische doses binnen de 24u en profylactische doses binnen de 12u voor (epi)durale of spinale procedures (verdooving, punctie).
- Trombocytopenie en antecedenten van trombocytopenie door heparines.
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Acute bacteriële endocarditis.
- Diabetische retinopathie.
- Ernstige nierinsufficiëntie; ernstige leverinsufficiëntie (SKP).



## Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Trombocytopenie: frequent (ook in de weken na stoppen van de behandeling).
- Hyperkaliëmie (zie Inl.6.2.7).
- Tijdelijke verhoging van de leverenzymen.
- Zelden: allergische reacties; bij langdurig gebruik: osteoporose en reversibele alopecie.

## Zwangerschap en borstvoeding

- Heparines worden als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Indien mogelijk wordt de heparinebehandeling kort vóór de bevalling onderbroken wegens het risico van bloeding.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van heparines met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).
- Verhoogd risico van hyperkaliëmie bij associëren met kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen, ACE-inhibitoren, sartanen en NSAID's.
- Verhoogd risico van vaatspasmen uitgelokt door ergotderivaten.

## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- De geactiveerde partiële tromboplastinetijd (*Activated Partial Thromboplastin Time*, APTT of *Activated Cephaline Time*, ACT) volgen bij curatieve toepassing.
- Het trombocytenaantal volgen bij behandeling gedurende meer dan 5 dagen, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling.
- De kaliëmie opvolgen bij nierinsufficiëntie.
- Antidotum: protamine 1.000 IE intraveneus per 1.000 IE heparine (zo nodig te herhalen, zie 20.1.1.2.).

### Posol.

- behandeling van diepe veneuze trombose en longembool:

- i.v. infuus: 20.000 à 40.000 IE per 24 uur, na een i.v. bolus van 5.000 of 10.000 IE
- i.v. injectie: 5.000 à 10.000 IE om de 4 à 6 uur (met meer bloedingsrisico tijdens de pieken van het antistollingseffect)
- s.c. injectie: 10.000 IE om de 8 uur

- infarct en instabiele angor: infuus van 30.000 IE per 24 uur, na een i.v. bolus van 5.000 of 10.000 IE

### HEPARINE LEO (Leo)

heparine, natrium

inj./inf. oplossing i.v. [flac.]

10 x 10 ml 100 IE / 1 ml R/ 33,67 €

50 x 5 ml 5.000 IE / 1 ml U.H. [213 €]

### HEPARINE NATRIUM B. BRAUN (B. Braun)

heparine, natrium

inj./inf. oplossing i.v. [flac.]



10 x 5 ml 5.000 IE / 1 ml U.H. [53 €]

#### 2.1.2.2.1.2. Heparines met laag moleculair gewicht

### Plaatsbepaling

- *Zie 2.1.2.*
- Heparines met laag moleculair gewicht hebben een lange halfwaardetijd en een hoge biologische beschikbaarheid.
- Bij gebrek aan direct vergelijkende studies zijn er geen bewijzen van verschil in werkzaamheid en ongewenste effecten tussen de diverse moleculen binnen deze groep.

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Behandeling en secundaire preventie van diepe veneuze trombose en longembool.
- Primaire preventie van diepe veneuze trombose bij chirurgische ingrepen met matig tot ernstig risico van trombose (bv. majeure orthopedische, abdominale of pelvische chirurgie) of bij langdurige immobilisatie bij bedlegerige patiënten met een acute medische aandoening en hoog risico van trombo-embolie.
- Instabiele angor en acuut coronair syndroom, samen met acetylsalicylzuur.
- Acuut ischemisch cerebrovasculair accident (bevestigd door beeldvorming), samen met acetylsalicylzuur.
- Ter vervanging van vitamine K-antagonisten tijdens de zwangerschap of bij ingrepen met hoog risico van bloeding.
- Preventie van coagulatie in het extracorporele circuit bij hemodialyse.

### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Toediening van therapeutische doses binnen de 24u en profylactische doses binnen de 12u voor (epi)durale of spinale procedures (verdoving, punctie).
- Trombocytopenie en antecedenten van trombocytopenie door heparines.
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Acute bacteriële endocarditis.
- Diabetische retinopathie.
- Nadroparine: ook ernstige nierinsufficiëntie (SKP).

### Ongewenste effecten

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Trombocytopenie: frequent, maar geringer risico dan met niet-gefractioneerde heparines; ook gevallen van trombocytose werden gemeld.
- Hyperkaliëmie (*zie Inl.6.2.7.*).
- Tijdelijke verhoging van de leverenzymen.
- Zelden: allergische reacties; bij langdurig gebruik (bv. zwangerschap): osteoporose en reversibele alopecie.

### Zwangerschap en borstvoeding

- Heparines met laag moleculair gewicht worden als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. Indien mogelijk wordt de heparinebehandeling 12-24u voor de bevalling onderbroken wegens het risico van maternale bloeding (postpartumbloedingen, maar ook risico van epiduraal hematoom bij epidurale verdoving).

### Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van heparines met laag moleculair gewicht met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).



- Verhoogd risico van bloeding bij associëren van heparines met laag moleculair gewicht met systemische corticosteroiden.
- Verhoogd risico van hyperkaliëmie bij associëren met kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen, ACE-inhibitoren, sartanen en NSAID's.
- Verhoogd risico van vaatspasmen uitgelokt door ergotderivaten.

## Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: zie 2.1.
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Het trombocytenaantal volgen bij behandeling gedurende meer dan 5 dagen, vooral tijdens de eerste weken van de behandeling.
- De kaliëmie opvolgen bij nierinsufficiëntie.
- Antidotum: protamine neutraliseert het effect van heparines met laag moleculair gewicht slechts ten dele: 1.400 IE protamine intraveneus neutraliseren ongeveer 1.000 IE anti-Xa van een heparine met laag moleculair gewicht (zo nodig te herhalen) (voor protamine, zie 20.1.1.2.).

## Posologie

- Heparines met laag moleculair gewicht worden subcutaan toegediend en vereisen meestal geen monitoring. Bij ernstige nierinsufficiëntie is dosisaanpassing vereist.
- De concentraties van de heparines met laag moleculair gewicht in de verschillende specialiteiten worden hieronder uitgedrukt in eenheden anti-factor Xa-activiteit (IE anti-Xa).
- De dosering die bij elk product wordt gegeven, is deze voor de behandeling van diepe veneuze trombose en longembolus, en voor de preventie van veneuze trombo-embolie bij laagrisicopatiënten. Bij uitgesproken risico van veneuze trombo-embolie is de dosis hoger. Er bestaat geen eensgezindheid of bij chirurgische ingrepen de eerste dosis vóór of na de ingreep moet toegediend worden.
- Behandelingsduur: LMWH's worden doorgaans enkel gebruikt in de opstartfase van een DVT-behandeling. Overschakelen naar de DOAC's dabigatran of edoxaban gebeurt na minstens 5 dagen behandeling met LMWH's (apixaban en rivaroxaban kunnen meteen opgestart worden zonder voorafgaande LMWH-toediening). Indien de DVT-behandeling met vitamine K-antagonisten zal worden voortgezet, worden beide geneesmiddelen gelijktijdig opgestart en de LMWH's gestaakt wanneer een therapeutische INR bereikt is.

## Dalteparine

De specialiteit **Fragmin®** is niet meer op de markt sinds november 2022.

*Posol.*

- behandeling: 200 IE anti-Xa/kg/d. in 1 à 2 injecties

- preventie: 2.500 IE anti-Xa p.d. in 1 injectie; bij hoog risico: 5.000 IE anti-Xa p.d. in 1 à 2 injecties

## Enoxaparine

*Posol.*

- behandeling: 150 IE anti-Xa/kg/d. in 1 injectie, of 100 IE anti-Xa/kg om de 12 uur

- preventie:

**CLEXANE (Sanofi Belgium)**

enoxaparine, natrium

inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]

10 x 2.000 IE anti-Xa / 0,2 ml (20 mg/0,2 ml) R/ b 26,38 €

10 x 4.000 IE anti-Xa / 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) R/ b 43,62 €

10 x 6.000 IE anti-Xa / 0,6 ml (60 mg/0,6 ml) R/ b 50,65 €

10 x 8.000 IE anti-Xa / 0,8 ml (80 mg/0,8 ml) R/ b 57,64 €

10 x 10.000 IE anti-Xa / 1 ml (100 mg/1 ml) R/ b 64,68 €





10 x 12.000 IE anti-Xa / 0,8 ml  
(120 mg/0,8 ml) R/ b 89,89 €  
10 x 15.000 IE anti-Xa / 1 ml (150  
mg/1 ml) R/ b 93,56 €

**ENOXAPARINE BECAT (MPI)**

enoxaparine, natrium

inj. oplossing. i.v./s.c. [voorgev. spuit]

10 x 2.000 IE anti-Xa / 0,2 ml (20  
mg/0,2 ml) R/ b 20,13 €  
10 x 4.000 IE anti-Xa / 0,4 ml (40  
mg/0,4 ml) R/ b 32,28 €  
10 x 6.000 IE anti-Xa / 0,6 ml (60  
mg/0,6 ml) R/ b 36,52 €  
10 x 8.000 IE anti-Xa / 0,8 ml (80  
mg/0,8 ml) R/ b 41,88 €

10 x 10.000 IE anti-Xa / 1 ml (100  
mg/1 ml) R/ b 46,70 €  
10 x 12.000 IE anti-Xa / 0,8 ml  
(120 mg/0,8 ml) R/ b 63,52 €  
10 x 15.000 IE anti-Xa / 1 ml (150  
mg/1 ml) R/ b 66,30 €

**GHEMAXAN (Effik)**

enoxaparine, natrium

inj. oplossing. i.v./s.c. [voorgev. spuit]

10 x 2.000 IE anti-Xa / 0,2 ml (20  
mg/0,2 ml) R/ b 20,13 €  
20 x 2.000 IE anti-Xa / 0,2 ml (20  
mg/0,2 ml) R/ b 32,78 €  
10 x 4.000 IE anti-Xa / 0,4 ml (40  
mg/0,4 ml) R/ b 32,28 €

20 x 4.000 IE anti-Xa / 0,4 ml (40  
mg/0,4 ml) R/ b 55,85 €  
10 x 6.000 IE anti-Xa / 0,6 ml (60  
mg/0,6 ml) R/ b 36,52 €  
20 x 6.000 IE anti-Xa / 0,6 ml (60  
mg/0,6 ml) R/ b 65,24 €  
10 x 8.000 IE anti-Xa / 0,8 ml (80  
mg/0,8 ml) R/ b 41,88 €  
10 x 12.000 IE anti-Xa / 0,8 ml  
(120 mg/0,8 ml) R/ b 63,52 €  
10 x 15.000 IE anti-Xa / 1 ml (150  
mg/1 ml) R/ b 66,30 €

## Nadroparine

*Posol.*

- behandeling: 171 IE anti-Xa/kg/d in 1 injectie (Fraxodi®), of 86 IE anti-Xa/kg om de 12 uur (Fraxiparine®)  
- preventie:

**FRAXIPARINE (Viatris)**

nadroparine, calcium

inj. oplossing. s.c. [voorgev. spuit]

10 x 2.850 IE anti-Xa / 0,3 ml R/ b 27,96 €  
10 x 3.800 IE anti-Xa / 0,4 ml R/ b 34,39 €  
10 x 5.700 IE anti-Xa / 0,6 ml R/ b 43,93 €  
10 x 7.600 IE anti-Xa / 0,8 ml R/ b 56,01 €  
10 x 9.500 IE anti-Xa / 1 ml R/ b 68,17 €

**FRAXODI (Viatris)**

nadroparine, calcium

inj. oplossing. s.c. [voorgev. spuit]

10 x 11.400 IE anti-Xa / 0,6 ml R/ b 77,84 €  
10 x 15.200 IE anti-Xa / 0,8 ml R/ b 100,28 €  
10 x 19.000 IE anti-Xa / 1 ml R/ b 122,68 €

## Tinzaparine

*Posol.*

- behandeling: 175 IE anti-Xa/kg/d. in 1 injectie  
- preventie:

**INNOHEP (Leo)**

tinzaparine, natrium

inj. oplossing. s.c. [voorgev. spuit]

10 x 3.500 IE anti-Xa / 0,35 ml R/ b 30,33 €  
10 x 4.500 IE anti-Xa / 0,45 ml R/ b 38,61 €



- 10 x 10.000 IE anti-Xa / 0,5 ml R/ b ○ 75,73 €
- 10 x 14.000 IE anti-Xa / 0,7 ml R/ b ○ 101,80 €
- 10 x 18.000 IE anti-Xa / 0,9 ml R/ b ○ 121,58 €

#### 2.1.2.2.1.3. Heparinoïden

Danaparoïde is een heparinoïd met laag moleculair gewicht.

### Plaatsbepaling

- *Zie 2.1.2.*

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Preventie en behandeling van diepe veneuze trombose bij patiënten met of antecedenten van trombocytopenie door heparines.

### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Toediening van therapeutische doses binnen de 24u en profylactische doses binnen de 12u voor (epi)durale of spinale procedures (verdooving, punctie).
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Acute bacteriële endocarditis.
- Diabetische retinopathie.
- Leverlijden met coagulopathie (SKP).

### Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Tijdelijke verhoging van de leverenzymen, rash.
- Zelden: trombocytopenie.

### Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van heparinoïden met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

### Bijzondere voorzorgen

- Voor preoperatief stoppen: *zie 2.1.*
- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.

## Danaparoïde

ORGARAN (Viatris) 

danaparoïde, natrium

inj./inf. oploss. i.v./s.c. [amp.]

10 x 750 IE anti-Xa / 0,6 ml U.H. [441 €]

#### 2.1.2.2.2. Bivalirudine

Bivalirudine inhibeert rechtstreeks trombine.

### Plaatsbepaling

- *Zie 2.1.2.*



## Indicaties (synthese van de SKP)

- Antistollingsbehandeling bij percutane coronaire interventie, steeds in associatie met acetylsalicylzuur en clopidogrel.
- Patiënten met instabiele angor of myocardinfarct, gepland voor dringende interventie.

## Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Acute bacteriële endocarditis.
- Ernstige nierinsufficiëntie (SKP).

## Ongewenste effecten

- Bloeding: het risico neemt toe bij nierinsufficiëntie.
- Gastro-intestinale stoornissen, tijdelijke verhoging van de leverenzymen.
- Zelden: anafylactische reacties.

## Zwangerschap en borstvoeding

- Er is heel weinig bekend over een eventuele nadelige invloed van bivalirudine tijdens de zwangerschap; uiterste voorzichtigheid is geboden.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van bivalirudine met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

## Bijzondere voorzorgen

- Bij ernstige bloeding kunnen vers plasma of concentraten van stollingsfactoren toegediend worden.
- Monitoring van de anticoagulerende behandeling is niet mogelijk.

*BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE (Accord)* 

bivalirudine

inj./inf. oploss. conc. (pdr.) i.v. [flac.]

5 x 250 mg U.H. [905 €]

### 2.1.2.2.3. Fondaparinux

Fondaparinux is een synthetische, specifieke inhibitor van factor Xa.

## Plaatsbepaling

- *Zie 2.1.2.*

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Preventie van diepe veneuze trombose en longembool bij majeure orthopedische chirurgie en bij hoogrisicopatiënten na abdominale chirurgie en bij langdurige immobilisatie.
- Acuut coronair syndroom (instabiele angor en myocardinfarct).
- Acute symptomatische en uitgebreide oppervlakkige veneuze trombose van de onderste ledematen.

## Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.



- Bacteriële endocarditis.

## Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Gastro-intestinale stoornissen, stijging van de leverenzymen, rash.
- Zelden: anemie, trombocytopenie.

## Interacties


- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van fondaparinux met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

## Bijzondere voorzorgen

- Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie en bij laag lichaamsgewicht wegens verhoogd bloedingsrisico.
- Bij ernstige bloeding kunnen vers plasma of concentraten van stollingsfactoren toegediend worden.
- Monitoring van de anticoagulerende behandeling is niet mogelijk.


*Posol.*

preventie: 2,5 mg p.d. in 1 injectie

**ARIXTRA (Viatris)** 

fondaparinux, natrium

inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]

10 x 2,5 mg / 0,5 ml R/ b  49,53 €

(i.v.: uitzonderlijk, zie SKP)

### 2.1.2.2.4. Proteïne C

Proteïne C is een derivaat van humaan plasma.

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Hypercoagulabiliteit door een aangeboren tekort aan proteïne C.

## Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Risico van overdracht van infecties kan niet helemaal worden uitgesloten, zoals met alle bloedderivaten.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van proteïne C met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

**CEPROTIN (Takeda)**

proteïne C [humaan plasma]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 500 IE + 5 ml solv. U.H. [847 €]



### 2.1.2.2.5. Antitrombine

Antitrombine is een derivaat van humaan plasma.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Preventie en behandeling van trombo-embolische accidenten bij patiënten met aangeboren of verworven tekort aan antitrombine.

#### Contra-indicaties

- Antecedenten van heparine-geïnduceerde trombocytopenie.

#### Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Risico van overdracht van infecties kan niet helemaal worden uitgesloten, zoals met alle bloedderivaten.
- Zelden: trombocytopenie.

#### Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van antitrombine met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

#### *ANTITROMBINE III-CONCENTRAAT BAXALTA (Takeda)*

antitrombine [humaan plasma]

inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 500 IE + 10 ml solv. U.H. [188 €]

1 x 1.000 IE + 20 ml solv. U.H. [370 €]

(met naalden en infuusset)

### 2.1.3. Trombolytica

Trombolytica kunnen recent gevormde bloedklonters oplossen door plasminogeen om te zetten in plasmine, dat een fibrinolytische activiteit heeft.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Alteplase: acuut myocardinfarct, longembool, ischemisch cerebrovasculair accident.
- Tenecteplase: acuut myocardinfarct.
- Urokinase: longembool, arteriële of veneuze trombose.

#### Contra-indicaties

- Actieve bloeding en verhoogd bloedingsrisico.
- Ernstige ongecontroleerde hypertensie.
- Bacteriële endocarditis, pericarditis.
- Diabetische retinopathie.
- Acute pancreatitis.
- Ernstige leverinsufficiëntie (SKP).
- Alteplase bij CVA: ook gecontra-indiceerd bij convulsies, hyper- of hypoglykemie, antecedenten van ernstig CVA, recent CVA (laatste drie maanden) of van CVA bij diabetici.
- Urokinase: ernstige nierinsufficiëntie (SKP).



## Ongewenste effecten

- Bloeding.
- Zelden: overgevoelighedsreacties.

## Interacties

- Verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren van trombololytica met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

## Alteplase

ACTILYSE (Boehringer Ingelheim)

alteplase [biosynthetisch]

inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

1 x 20 mg + 20 ml solv. U.H. [241 €]

1 x 50 mg + 50 ml solv. U.H. [488 €]

## Tenecteplase


METALYSE (Boehringer Ingelheim)

tenecteplase [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. + voorgev. spuit]

1 x 10.000 E + 10 ml solv. U.H. [960 €]

## Urokinase

ACTOSOLV (Eumedica) 

urokinase

inj./inf. oploss. (pdr.) i.v./i.arter. [flac.]

1 x 100.000 IE U.H. [59 €]

1 x 600.000 IE U.H. [329 €]

## 2.1.4. Andere antitrombotica

Caplacizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaamfragment (*nanobody*) dat bindt aan de von Willebrand factor en zo de bloedplaatjesaggregatie bij verworven trombotische trombocytopenische purpura tegengaat.

Defibrotide is een mengsel van oligonucleotiden verkregen uit intestinale mucosa van varkens.

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Caplacizumab: behandeling van volwassenen en jongeren van 12 jaar of ouder (met een lichaamsgewicht van minstens 40 kg) die een episode van verworven trombotische trombocytopenische purpura (aTTP) doormaken.
- Defibrotide: behandeling van ernstige hepatische veno-occlusieve ziekte bij hematopoëtische stamceltransplantatie.

### Contra-indicaties

- Defibrotide: gelijktijdig gebruik van trombololytica.

### Ongewenste effecten

- Caplacizumab: bloedingen, hoofdpijn, urticaria, vermoeidheid, koorts.



- Defibrotide: bloeding, hypotensie, braken.

## Interacties

- Caplacizumab: verhoogd risico van bloeding bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia, hoge doses heparine of antiaggregantia.
- Defibrotide: verhoogd risico van bloeding bij inname van meerdere antitrombotische middelen of bij associëren met andere middelen die bloeding kunnen veroorzaken zoals de NSAID's, de SSRI's en de serotonine- en noradrenaline-heropnameremmers (SNRI's).

### *CABLIVI (Ablynx)*

caplacizumab [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v./s.c. [flac. + voorgev. spuit]

1 x 10 mg + 1 ml solv. U.H. [3.635 €]

(weesgeneesmiddel)

### *DEFITELIO (Jazz Pharmaceuticals)*

defibrotide

inf. oploss. (conc.) i.v. [flac.]

10 x 200 mg / 2,5 ml U.H. [4.516 €]

(weesgeneesmiddel)

## 2.2. Antihemorragica

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:

- stollingsfactoren en monoklonale antilichamen
- antifibrinolytica
- etamsylaate
- lokale preparaten.

Andere producten die gebruikt worden in het kader van bloedingen zijn de volgende.

- Protamine: antidotum van de heparines (zie 2.1.2.2.1. en 20.1.1.2.).

- Vitamine K: antidotum van de vitamine K-antagonisten (zie 2.1.2.1.1. en 14.2.1.4.).

- Idarucizumab: monoklonaal antilichaam gebruikt als antidotum voor dabigatran (zie 20.1.1.4. en Folia mei 2016).

- Andexanet alfa: een recombinante en geïnactiverde stollingsfactor Xa, gebruikt als antidotum voor apixaban en rivaroxaban (zie 20.1.1.5.).

- Desmopressine (zie 5.5.2.), een analoog van het antidiuretisch hormoon: antihemorragicum bij plaatjesdisfunctie, bij lichte vormen van hemofilie A (de klassieke hemofilie) en bij de ziekte van von Willebrand, dikwijls samen met een antifibrinolyticum. Daarenboven wordt het gebruikt als hemostaticum bij cirrotische en uremische patiënten en na cardiopulmonale chirurgie.

- Somatostatine (zie 5.5.5.): behandeling van gastro-intestinale bloedingen secundair aan ulcus of erosieve gastritis.

### 2.2.1. Stollingsfactoren en monoklonale antilichamen

Stollingsfactoren of protrombinecomplexconcentraten zijn geïndiceerd bij bloedingen t.g.v. een gebrek aan deze factoren. Ze worden bereid uit humaan plasma (plasmaderivaten) of geproduceerd door middel van recombinanttechnologie. Bij de bereiding van plasmaderivaten wordt gebruik gemaakt van methoden om virussen te inactiveren, zoals bv. solvent/detergent, warmtebehandeling of nanofiltratie.

De biosynthetische stollingsfactoren VII, VIII en IX worden respectievelijk eptacog alfa, octocog alfa en nonacog alfa genoemd. Damoctocog alfa pegol, efmoroctocog alfa, lonococog alfa, morococog alfa, simococog alfa, turocogog alfa en susococog alfa zijn biosynthetische analogen van factor VIII. Albutrepenonacog alfa,



eftrenocog alfa, nonacog bèta pegol en nonacog gamma zijn biosynthetische analogen van factor IX. Emicizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat geactiveerde factor IX en factor X bindt ter compensatie van het factor VIII-tekort bij hemofilie A. Het bootst de werking van factor VIII na.

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Behandeling en profylaxe van bloedingen ten gevolge van aangeboren gebrek aan stollingsfactoren of (voor sommige producten) ten gevolge van verworven gebrek aan stollingsfactoren.
- Geactiveerde stollingsfactor VII (eptacog alfa): ook ernstige postpartumbloeding, wanneer uterotonica onvoldoende zijn om hemostase te bekomen.

## Contra-indicaties

- Factor IX: diffuse intravasale stolling (DIS).
- Protrombinecomplexconcentraat: angor, antecedenten van heparine-geïnduceerde trombocytopenie.
- Geactiveerde stollingsfactoren: diffuse intravasale stolling (DIS); ernstige leveraandoeningen; myocardinfarct, acute trombose en/of embolie.

## Ongewenste effecten

- Risico van overgevoeligheidsreacties die ernstig kunnen zijn.
- Risico van overdracht van infecties kan niet helemaal worden uitgesloten met de bloederivaten.
- Vorming van neutraliserende antilichamen.
- Emicizumab: gewrichtspijnen, hoofdpijn, diarree, spierpijn en koorts; trombotische microangiopathie en trombo-embolie.

## Zwangerschap en borstvoeding

- Emicizumab: vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten effectieve anticonceptie krijgen tot 6 maanden na het stoppen van emicizumab.

## Factor VIII of antihemofiliefactor A en monoklonale antilichamen gebruikt bij hemofilie A

<i>ADVATE (Takeda)</i> octocog alfa [biosynthetisch] inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	500 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 446,19 €	250 IE + 2,5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 182,78 €
1250 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 162,23 €	1.000 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 876,38 €	500 IE + 2,5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 354,99 €
2500 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 313,88 €	2.000 IE + 5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.627,87 €	1.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 699,41 €
5000 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 617,20 €	<i>ADYNOVI (Abacus)</i> rurioctocog alfa, pegol [biosynthetisch] inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	2.000 IE + 5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.388,23 €
7500 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.002,28 €	1.000 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 876,38 €	3.000 IE + 5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 2.077,07 €
10.000 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.267,96 €	2.000 IE + 5 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.627,87 €	<i>ELOCTA (Swedish Orphan)</i> efmorocog alfa [biosynthetisch] inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. + voorgev. spuit]
15.000 IE + 2 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 1.951,38 €	(parallele distributie)	250 IE + 3 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 199,76 €
<i>ADYNOVI (Takeda)</i> rurioctocog alfa, pegol [biosynthetisch] inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac., Baxject III]	<i>AFSTYLA (CSL Behring)</i> lonocog alfa [biosynthetisch] inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]	500 IE + 3 ml solv. R/ a <sup>†</sup> ○ 388,94 €





- 1.000 IE + 3 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 767,32 €
- 1.500 IE + 3 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.145,68 €
- 2.000 IE + 3 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.524,07 €
- 3.000 IE + 3 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 2.280,80 €

**ELOCTA (Orifarm Belgium)**

efmorococog alfa [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 3.000 IE + 3 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 2.280,80 €

(parallele distributie)

**ESPEROCT (Novo Nordisk)**

turocog alfa, pegol [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 388,94 €
- 1.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 767,32 €
- 1.500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.145,68 €
- 2.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.524,07 €
- 3.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 2.280,80 €

**ESPEROCT (Abacus)**

turocog alfa, pegol [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 388,94 €
- 1.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 767,32 €

(parallele distributie)

**FACTANE (C.A.F. - D.C.F.)**

factor VIII [humaan plasma]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

- 1.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 720,46 €
- 2.000 IE + 10 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.430,35 €

**HEMLIBRA (Roche)**

emicizumab [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [flac.]

- 1 x 30 mg / 1 ml R/ a<sup>†</sup> ○ 2.295,22 €
- 1 x 60 mg / 0,4 ml R/ a<sup>†</sup> ○ 4.579,86 €
- 1 x 105 mg / 0,7 ml R/ a<sup>†</sup> ○ 8.006,82 €
- 1 x 150 mg / 1 ml R/ a<sup>†</sup> ○ 11.433,77 €

**HEMLIBRA (Abacus)**

emicizumab [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [flac.]

1 x 60 mg / 0,4 ml R/  
(parallele distributie)

**JIVI (Bayer)**

damococog alfa, pegol [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 1 x 500 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 388,94 €
- 1 x 1.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 767,32 €
- 1 x 2.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.524,07 €
- 1 x 3.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 2.280,80 €

**KOVALTRY (Bayer)**

octocog alfa [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 500 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 334,75 €
- 1.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 658,90 €
- 2.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.267,96 €
- 3.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.951,38 €

**NOVOEIGHT (Novo Nordisk)**

turocog alfa [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 250 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 177,94 €

- 500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 345,28 €

- 1.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 680,00 €

- 1.500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.014,72 €

- 2.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.349,43 €

- 3.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 2.018,84 €

**NUWIQ (Octapharma)**

simococog alfa [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

- 250 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 177,94 €

- 500 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 345,28 €

- 1.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 680,00 €

- 2.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 1.349,43 €

**OBIZUR (Takeda)**

susococog alfa [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

500 IE + 1 ml solv. U.H. [1.076 €]  
(enkel bij verworven hemoflie)

**OCTANATE (Octapharma)**

factor VIII [humaan plasma]

inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

- 250 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 162,23 €

- 500 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 313,88 €

- 1.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 617,20 €

**REFACTO AF (Pfizer)**

morococog alfa [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [voorgev.  
spuit]

- 250 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 182,78 €

- 500 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 354,99 €

- 1.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 699,41 €



2.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
1.388,23 €

3.000 IE + 4 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
2.077,07 €

## Factor von Willebrand

*WILFACTIN (C.A.F. - D.C.F.)*

factor von Willebrand [humaan plasma]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

1.000 IE + 10 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○ 899,22 €

## Factor VIII + factor von Willebrand

*HAEMATE P (CSL Behring)*

factor VIII [humaan plasma] 500 IE  
factor von Willebrand [humaan plasma] 1.200 IE  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

R/ a<sup>†</sup> ○ 517,45 €

factor VIII [humaan plasma] 1.000 IE  
factor von Willebrand [humaan plasma] 2.400 IE  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

R/ a<sup>†</sup> ○ 1.019,29 €

(ook bij verworven hemofilie)

*WILATE (Octapharma)*

factor VIII [humaan plasma] 500 IE  
factor von Willebrand [humaan plasma] 500 IE  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

R/ a<sup>†</sup> ○ 345,80 €

factor VIII [humaan plasma] 1.000 IE  
factor von Willebrand [humaan plasma] 1.000 IE  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

R/ a<sup>†</sup> ○ 681,03 €

## Factor IX of antihemofiliefactor B

*ALPROLIX (Swedish Orphan)*

eftrenonacog alfa [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

250 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
311,83 €

500 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
613,10 €

1.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
1.215,64 €

2.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
2.420,70 €

3.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
3.625,76 €

(weesgeneesmiddel)

*BENEFIX (Pfizer)*

nonacog alfa [biosynthetisch]  
inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

500 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
311,56 €

1.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
612,52 €

2.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
1.214,47 €

*IDELVION (CSL Behring)*

albutrepenonacog alfa [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

250 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
490,82 €

500 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
971,04 €

1.000 IE + 2,5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
1.931,53 €

2.000 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
3.852,51 €

3.500 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
6.733,95 €

(weesgeneesmiddel)

*OCTANINE (Octapharma)*

factor IX [humaan plasma]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

500 IE + 5 ml solv. R/ a<sup>†</sup> ○  
223,99 €



1.000 IE + 10 ml solv. R/ a † ○  
437,44 €

*REFIXIA (Novo Nordisk)*

nonacog bèta, pegol [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. +  
voorgev. spuit]

500 IE + 4 ml solv. R/ a † ○  
735,25 €

1.000 IE + 4 ml solv. R/ a † ○  
1.459,73 €

2.000 IE + 4 ml solv. R/ a † ○  
2.908,87 €

*RIXUBIS (Takeda)*

nonacog gamma [biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]

250 IE + 5 ml solv. R/ a † ○  
161,07 €

500 IE + 5 ml solv. R/ a † ○  
311,56 €

1.000 IE + 5 ml solv. R/ a † ○  
612,52 €

2.000 IE + 5 ml solv. R/ a † ○  
1.214,48 €

## Factor XIII

*CLUVOT (CSL Behring)*

factor XIII [humaan plasma]  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
250 IE + 4 ml solv. U.H. [122 €]

## Protrombinecomplexconcentraat

*COFACT (C.A.F. - D.C.F.)*

factor II [humaan plasma] 140 IE  
factor VII [humaan plasma] 70 IE  
factor IX [humaan plasma] 250 IE  
factor X [humaan plasma] 140 IE  
proteïne C [humaan plasma] 111 IE  
proteïne S [humaan plasma] 10 IE  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
126 €

factor II [humaan plasma] 280 IE  
factor VII [humaan plasma] 140 IE  
factor IX [humaan plasma] 500 IE  
factor X [humaan plasma] 280 IE  
proteïne C [humaan plasma] 222 IE  
proteïne S [humaan plasma] 20 IE

inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
239 €

*CONFIDEX (CSL Behring)*

factor II [humaan plasma] 400 IE  
factor VII [humaan plasma] 200 IE  
factor IX [humaan plasma] 400 IE  
factor X [humaan plasma] 440 IE  
proteïne C [humaan plasma] 300 IE  
proteïne S [humaan plasma] 240 IE  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
239 €

*OCTAPLEX (Octapharma)*

factor II [humaan plasma] 280 IE

factor VII [humaan plasma] 180 IE  
factor IX [humaan plasma] 500 IE  
factor X [humaan plasma] 360 IE  
proteïne C [humaan plasma] 260 IE  
proteïne S [humaan plasma] 240 IE  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
239 €

factor II [humaan plasma] 560 IE  
factor VII [humaan plasma] 360 IE  
factor IX [humaan plasma] 1.000 IE  
factor X [humaan plasma] 720 IE  
proteïne C [humaan plasma] 520 IE  
proteïne S [humaan plasma] 480 IE  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
467 €

## Geactiveerde stollingsfactoren

*FEIBA (Takeda)*

FEIBA [Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity, met de geactiveerde factoren van het protrombinecomplex, humaan plasma]  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
1.000 E + 20 ml solv. U.H. [713 €]  
(voornamelijk factor VIIa; ook bij verworven hemofilie)

*NOVOSEVEN (Novo Nordisk)*

eptacog alfa [geactiveerd, biosynthetisch]  
inj. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [flac. + voorgev. spuit]  
50.000 IE + 1 ml solv. U.H. [471 €]  
100.000 IE + 2 ml solv. U.H. [943 €]  
250.000 IE + 5 ml solv. U.H. [2.357 €]  
(ook bij verworven hemofilie)



## Fibrinogeen

### *FIBCLLOT (LFB)*

fibrinogeen [humaan plasma]  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
1,5 g + 100 ml solv. U.H. [618 €]

### *FIBRYGA (Octapharma)*

fibrinogeen [humaan plasma]  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v. [2x flac.]  
1 g + 50 ml solv. U.H. [412 €]

### *RIASTAP (CSL Behring)*

fibrinogeen [humaan plasma]  
inj./inf. oploss. (pdr.) i.v. [flac.]  
1 x 1 g U.H. [412 €]

## 2.2.2. Antifibrinolytica

### Plaatsbepaling

- Bij gebruik van antifibrinolytica ter preventie van bloedingen moet de risico/baten verhouding telkens afgewogen worden. Na niet-cardiale heelkunde tonen studiegegevens een significante afname van het aantal majeure bloedingen na profylactische toediening van tranexaminezuur, zonder toename van cardiovasculaire ongewenste effecten.
- Continue toediening is niet onderbouwd.

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Tranexaminezuur: menorrhagieën (bv. ten gevolge van een koper-IUD), bepaalde types chirurgie (NKO, gynaecologisch, urologisch, thoraco-abdominaal, tandheelkunde).
- Aprotinine: preventie van bloedingen tijdens een coronaire bypass bij patiënten met hoog bloedingsrisico.

### Contra-indicaties

- Arteriële of veneuze trombo-embolie.
- Antecedenten van convulsies.
- Tranexaminezuur: ernstige nierinsufficiëntie.

### Ongewenste effecten

- Arteriële of veneuze trombose op elke locatie.
- Tranexaminezuur: acuut nierfalen, gastro-intestinale stoornissen; zelden: visusstoornissen en gewijzigd kleurenzicht.
- Aprotinine: anafylactische shock, acuut nierfalen en verslechtering van bestaand nierlijden, trombose, ischemie.

### Interacties

- Verhoogd risico van trombose bij associatie met geneesmiddelen die het trombo-embolisch risico verhogen (bv. oestrogenen).
- Bij bloeding ter hoogte van de urinewegen is er risico van het ontstaan van trombus met occlusie.

### Bijzondere voorzorgen

- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verhoogd risico van trombose.
- Bij bloeding ter hoogte van de urinewegen is er risico van het ontstaan van trombus met occlusie.

## Aprotinine

### *TRASYLOL (Nordic Pharma)*

aprotinine  
inj./inf. oploss. i.v. [flac.]  
1 x 500.000 KIE / 50 ml U.H. [74 €]



## Tranexaminezuur

*Posol.per os*

: 2 à 4,5 g p.d. in 1 of meerdere doses

**EXACYL (Eurocept)**

tranexaminezuur  
filmomh. tabl.

100 x 250 mg R/ b 20,45 €

20 x 500 mg R/ b 13,67 €

oploss. (unidose)

10 x 1 g / 10 ml R/ b 14,16 €

inj. oploss. i.v. [amp.]

6 x 500 mg / 5 ml R/ b 12,79 €

### 2.2.3. Etamsylaate

#### Plaatsbepaling

- Etamsylaate, een aspecifiek hemostaticum, wordt zonder veel argumenten gebruikt bij bloedingen waarvoor geen precieze oorzaak kan worden vastgesteld. Bij het bestaan van een bloeding moet eerst elke mogelijke oorzaak worden opgespoord.

#### Ongewenste effecten

- Hoofdpijn, rash, hyperthermie.
- Orale toediening: ook gastro-intestinale last.
- Intraveneuze toediening: ook hypotensie.

**DICYNONE (Omedicamed)**

etamsylaate  
tabl.

20 x 250 mg R/ 11,85 €

### 2.2.4. Lokale preparaten

#### Plaatsbepaling

- Deze preparaten worden voorgesteld ter bevordering van de hemostase en de wondheling, bv. bij chirurgische ingrepen. Bewijs van werkzaamheid op klinische eindpunten ontbreekt.

#### Ongewenste effecten

- Risico van overdracht van infecties met de bloedderivaten.

**ARTISS (Baxter)**

component I

aprotinine 3.000 KIE / 1 ml

fibrinogeen [humaan plasma] 91 mg / 1

ml

weefsellijm (oploss.) [voorgev. spuit] (I)

component II

calcium, chloride 4,44 mg / 1 ml

trombine [humaan plasma] 4 IE / 1 ml

weefsellijm (oploss.) [voorgev. spuit] (II)

2 ml R/ 126,98 € (I+II)

4 ml R/ 223,67 € (I+II)

(diepgevroren oplossingen)

**TACHOSIL (Corza)**



fibrinogeen [humaan plasma] 5,5 mg /  
1 cm<sup>2</sup>  
trombine [humaan plasma] 2 IE / 1 cm<sup>2</sup>  
epilaes. medic. spons  
1 x (3 x 2,5 cm) 42 €  
2 x (4,8 x 4,8 cm) 243 €  
1 x (9,5 x 4,8 cm) 221 €

*TISSEEL S/D (Baxter)*  
component I  
aprotinine 3.000 KIE / 1 ml  
fibrinogeen [humaan plasma] 72 mg / 1  
ml  
factor XIII [humaan plasma] 0,6 IE / 1  
ml  
weefsellijm (oploss.) [voorgev. spuit] (I)

component II  
calcium, chloride 4,44 mg / 1 ml  
trombine [humaan plasma] 500 IE / 1  
ml  
weefsellijm (oploss.) [voorgev. spuit] (II)  
2 ml 130 € (I+II)  
4 ml 242 € (I+II)  
10 ml 561 € (I+II)  
(diepgevroren oplossingen)

## 2.3. Middelen i.v.m. de bloedvorming

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:

- middelen bij anemie
- middelen bij trombocytopenie
- middelen bij neutropenie en stamcelmobilisatie.

### 2.3.1. Middelen bij anemie

Anemie kan ontstaan door een verminderde aanmaak of een verhoogde afbraak van erythrocyten, of door bloedverlies.

IJzer (zie 14.1.1.) is noodzakelijk voor de synthese van hemoglobine en wordt gebruikt bij ferriprievie anemie.

Vitamine B (zie 14.2.2.5.) en foliumzuur (zie 14.2.2.6.) zijn nodig voor de aanmaak van o.a. rode bloedcellen en worden gebruikt bij vitamine B-tekort of foliumzuurtekort, en bij pernicieuze anemie.

#### 2.3.1.1. Epoëtines

- Erytropoëtine stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen.

- Epoëtines (biosynthetische erytropoëtines) zijn identiek aan het humane erytropoëtine.

- Darbepoëtine en epoëtine bèta zijn analogen van erythropoëtine die minder frequent moeten worden toegediend dan erytropoëtine.

#### Plaatsbepaling

- Epoëtines worden gebruikt bij patiënten met anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie of ten gevolge van chemotherapie met als doel de nood voor bloedtransfusie te verminderen en/of de levenskwaliteit te verbeteren.
- Bij anemie gepaard met kanker verbetert de toediening van epoëtines de overleving niet.

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Anemie bij chronische nierinsufficiëntie.
- Autologe bloedtransfusie, anemie bij prematuren en in het kader van chemotherapie.

#### Contra-indicaties

- *Pure red cell anemia* na behandeling met epoëtines.
- Niet-gecontroleerde hypertensie.

#### Ongewenste effecten

- *Zie Folia februari 2008.*
- Vermoeidheid, grieperige symptomen.
- Bot- en gewrichtspijnen.
- Gastro-intestinale stoornissen.
- Hoofdpijn.
- Hypertensie.



- Hyperkaliëmie.
- Trombose, vooral met doses waarbij een hemoglobineconcentratie hoger dan 12 g/dl wordt nagestreefd.
- Rash (zelden syndroom van Stevens-Johnson en Toxische Epidermale Necrolyse).
- Vermoeden van progressie van bepaalde maligniteiten bij gebruik in het kader van anemie ten gevolge van chemotherapie.
- Zelden: *pure red cell anemia* bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

<b>ARANESP (Amgen)</b> darbepoëtine alfa [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]	6 x 2.000 IE / 1 ml U.H. [77 €] 6 x 4.000 IE / 0,4 ml U.H. [146 €] 6 x 10.000 IE / 1 ml U.H. [365 €] 1 x 40.000 IE / 1 ml U.H. [190 €]	1 x 75 µg / 0,3 ml U.H. [115 €] 1 x 100 µg / 0,3 ml U.H. [154 €] 1 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [231 €] 1 x 200 µg / 0,3 ml U.H. [307 €] 1 x 250 µg / 0,3 ml U.H. [384 €]
4 x 10 µg / 0,4 ml U.H. [76 €] 4 x 20 µg / 0,5 ml U.H. [151 €] 4 x 30 µg / 0,3 ml U.H. [238 €] 4 x 40 µg / 0,4 ml U.H. [303 €] 4 x 50 µg / 0,5 ml U.H. [396 €] 4 x 60 µg / 0,3 ml U.H. [476 €] 4 x 80 µg / 0,4 ml U.H. [634 €] 4 x 100 µg / 0,5 ml U.H. [770 €] 4 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [1.094 €] 1 x 300 µg / 0,6 ml U.H. [541 €] 1 x 500 µg / 1 ml U.H. [867 €]	<b>EPREX (Janssen-Cilag)</b> epoëtine alfa [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]	<b>NEORECORMON (Roche)</b> epoëtine bèta [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]
<b>ARANESP (Amgen)</b> darbepoëtine alfa [biosynthetisch] inj. oploss. s.c. SureClick [voorgev. pen]	6 x 1.000 IE / 0,5 ml U.H. [43 €] 6 x 2.000 IE / 0,5 ml U.H. [86 €] 6 x 3.000 IE / 0,3 ml U.H. [130 €] 6 x 4.000 IE / 0,4 ml U.H. [173 €] 6 x 5.000 IE / 0,5 ml U.H. [216 €] 6 x 6.000 IE / 0,6 ml U.H. [260 €] 6 x 8.000 IE / 0,8 ml U.H. [346 €] 6 x 10.000 IE / 1 ml U.H. [433 €] 6 x 20.000 IE / 0,5 ml U.H. [865 €] 6 x 40.000 IE / 1 ml U.H. [1.478 €]	6 x 500 IE / 0,3 ml U.H. [25 €] 6 x 2.000 IE / 0,3 ml U.H. [100 €] 6 x 3.000 IE / 0,3 ml U.H. [149 €] 6 x 4.000 IE / 0,3 ml U.H. [190 €] 6 x 5.000 IE / 0,3 ml U.H. [238 €] 6 x 6.000 IE / 0,3 ml U.H. [285 €] 6 x 10.000 IE / 0,6 ml U.H. [475 €] 4 x 30.000 IE / 0,6 ml U.H. [951 €]
1 x 150 µg / 0,3 ml U.H. [280 €] 1 x 300 µg / 0,6 ml U.H. [541 €] 1 x 500 µg / 1 ml U.H. [867 €]	<b>MIRCERA (Roche)</b> (methoxypolyethyleenglycol)epoëtine bèta [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]	<b>NEORECORMON (Abacus)</b> epoëtine bèta [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]
<b>BINOCRIT (Sandoz)</b> epoëtine alfa [biosynthetisch] inj. oploss. i.v./s.c. [voorgev. spuit]	1 x 50 µg / 0,3 ml U.H. [77 €]	6 x 5.000 IE / 0,3 ml U.H. [238 €] 6 x 10.000 IE / 0,6 ml U.H. [] (parallele distributie)

### 2.3.1.2. Roxadustat

Hypoxie-induceerbare factor (HIF) stimuleert in geval van hypoxie de aanmaak van rode bloedcellen en hemoglobine. Het enzym propylhydroxylase komt tussen in de afbraak van HIF. Roxadustat inhibeert dit enzym met als gewenst effect een stijging van HIF.

#### Plaatsbepaling

- Bij de behandeling van symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierschade is de werkzaamheid van roxadustat vergelijkbaar met deze van de epoëtines. Gebruik van roxadustat lijkt evenwel gepaard te gaan met een toename van de mortaliteit en van trombotische events en van infecties, waardoor de kosten-batenbalans eerder nadelig lijkt (zie *Folia januari 2024*).

#### Indicaties (synthese van de SKP)

- Symptomatische anemie ten gevolge van chronische nierschade.

#### Contra-indicaties

- Derde trimester van de **zwangerschap, borstvoeding**.



- Soja- of pinda-allergie.

## Ongewenste effecten

- Hypertensie.
- Hyperkaliëmie.
- Trombose van de vaattoegang voor dialyse, diepe veneuze trombose.
- Gastro-intestinale stoornissen.
- Hoofdpijn, convulsies.
- Sepsis.
- Perifeer oedeem.

## Zwangerschap en borstvoeding

- Zwangerschap:
  - Roxadustat is gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap (op basis van SKP).
  - Effectieve anticonceptie moet gebruikt worden tijdens de behandeling en tot 1 week erna.
- Borstvoeding:
  - Roxadustat is gecontra-indiceerd tijdens de borstvoeding (op basis van SKP).

## Interacties

- Roxadustat moet minstens 1u na de toediening van fosfaat-chelatoren of preparaten die calcium, ijzer, magnesium of aluminium bevatten, worden ingenomen.
- Roxadustat is een substraat van CYP2C8 (zie Tabel 1c. in Inl.6.3.).
- Roxadustat is een inhibitor van OATP1B1 en kan op die manier de plasmaconcentraties (en ongewenste effecten) van de statines verhogen.

## Bijzondere voorzorgen

- Het gebruik van roxadustat wordt afgeraden in geval van ernstige leverinsufficiëntie.

## Toediening en posologie

- Het complexe doseringsschema (inname op 3 niet-opvolgende dagen per week), is gevoelig voor innamefouten.

### EVRENZO (Astellas)

roxadustat  
filmomh. tabl.

- 12 x 20 mg R/ a †  51,76 €
- 12 x 50 mg R/ a †  116,26 €
- 12 x 70 mg R/ a †  158,54 €
- 12 x 100 mg R/ a †  221,95 €
- 12 x 150 mg R/ a †  327,65 €

### 2.3.1.3. Luspatercept

Luspatercept is een recombinant fusie-eiwit dat resulteert in erythroïde rijping.

## Indicaties (synthese van de SKP)

- Bepaalde transfusie-afhankelijke anemieën veroorzaakt door een myelodysplastisch syndroom.
- Anemie bij bèta-thalassemie.





## Contra-indicaties

- Zwangerschap.

## Ongewenste effecten

- Vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn.
- Duizeligheid, hoofdpijn.
- Hypertensie.
- Trombo-embolie.
- Gastro-intestinale last.
- Infecties (bovenste luchtwegen, urinewegen).

### *REBLOZYL (Bristol-Myers Squibb)*

luspatercept [biosynthetisch]

inj. oplossing (pdr.) s.c. [flac.]

1 x 25 mg U.H. [1.567 €]

1 x 75 mg U.H. [4.699 €]

(weesgeneesmiddel)

### *REBLOZYL (Abacus)*

luspatercept [biosynthetisch]

inj. oplossing (pdr.) s.c. [flac.]

1 x 25 mg U.H. []

(weesgeneesmiddel; parallelle distributie)

## 2.3.2. Middelen bij trombocytopenie

Avatrombopag, eltrombopag en romiplostim zijn agonisten van de receptor voor trombopoëetine, een hormoon dat de bloedplaatjesproductie stimuleert.

### Indicaties (synthese van de SKP)

- Immun trombocytopenie, resistent tegen andere behandelingen (corticosteroiden, immunoglobulinen).
- Avatrombopag: ook ernstige trombocytopenie bij patiënten met een chronische leveraandoening ter voorbereiding van een invasieve procedure.
- Eltrombopag: ook trombocytopenie bij chronische hepatitis C, ernstige aplastische anemie die refractair is voor andere behandelingen.

### Ongewenste effecten

- Verhoging van het trombocytenaantal, zelden trombo-embolie.
- Bloeding na stoppen van de toediening.
- Overgevoelighedsreacties.
- Eltrombopag: ook verhoging van de leverenzymen (reversibel).
- Romiplostim: ook respiratoire infecties.

### Interacties

- Avatrombopag is een substraat van CYP3A4 en CYP2C9 (zie Tabel 1c. in Inl.6.3.).

## Avatrombopag

### *DOPTELET (Swedish Orphan)*



avatrombopag (maleaat)

filmomh. tabl.

- 10 x 20 mg U.H. [673 €]
- 15 x 20 mg U.H. [1.049 €]
- 30 x 20 mg U.H. [2.098 €]

## Eltrombopag

REVOLADE (Novartis Pharma)

eltrombopag (olamine)

filmomh. tabl.

- 28 x 25 mg U.H. [766 €]
- 28 x 50 mg U.H. [1.531 €]

## Romiplostim

NPLATE (Amgen)

romiplostim [biosynthetisch]

inj. oploss. (pdr.) s.c. [flac.]

- 1 x 125 µg U.H. [273 €]

inj. oploss. (pdr. + solv.) s.c. [flac. + voorgev. spuit]

- 1 x 250 µg + 0,72 ml solv. U.H. [467 €]
- 1 x 500 µg + 1,2 ml solv. U.H. [934 €]

### 2.3.3. Middelen bij neutropenie en stamcelmobilisatie

Het betreft *Granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF)* en plerixafor, dat een inhibitor is van de adhesiemoleculen van stamcellen.

#### Plaatsbepaling

- De G-CSF factoren worden gebruikt om neutropenie door cytostatische of immunosuppressieve behandeling tegen te gaan, maar ook in sommige gevallen van idiopathische of congenitale neutropenie. De bedoeling is o.a. het risico en de duur van infecties te beperken door het aantal neutrofielen te verhogen.
- Ze worden ook gebruikt voor de mobilisatie van hematopoëtische stamcellen voor inzameling voor beenmergtransplantatie.
- Plerixafor wordt, in associatie met G-CSF, gebruikt voor mobilisatie van stamcellen uit het perifere bloed bij autologe beenmergtransplantatie.

#### Ongewenste effecten

- Spier- en skeletpijn, dysurie, hoofdpijn, trombocytopenie, anemie, longafwijkingen, hemoptoë.
- Zelden: overgevoeligheid.

#### Toediening en posologie

- Lipegfilgrastim en pegfilgrastim zijn langwerkende vormen van filgrastim en vereisen slechts één injectie per chemokuur.

## Filgrastim

ACCOFIL (Accord)

filgrastim [biosynthetisch]

inj./inf. oploss. (conc.) i.v./s.c. [voorgev. spuit]

1 x 12 ME / 0,2 ml (0,12 mg/0,2 ml) R/ a ! Ⓞ 26,58 €

5 x 30 ME / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml) R/ a ! Ⓞ 225,21 €



5 x 48 ME / 0,5 ml (0,48 mg/0,5 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 314,25 €  
1 x 70 ME / 0,73 ml (0,7 mg/0,73 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 98,88 €

**NEUPOGEN (Amgen)**  
filgrastim [biosynthetisch]  
inj./inf. oploss. (conc.) i.v./s.c. [flac.]

5 x 30 ME / 1 ml (0,3 mg/1 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 231,81 €  
inj./inf. oploss. (conc.) i.v./s.c. [voorgev. spuit]  
5 x 30 ME / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 231,13 €  
5 x 48 ME / 0,5 ml (0,48 mg/0,5 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 322,16 €

**TEVAGRASTIM (Teva)**  
filgrastim [biosynthetisch]  
inj./inf. oploss. (conc.) i.v./s.c. [voorgev. spuit]  
5 x 30 ME / 0,5 ml (0,3 mg/0,5 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 231,14 €  
5 x 48 ME / 0,8 ml (0,48 mg/0,8 ml) R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 321,72 €

## Lenograstim

**GRANOCYTE (DHL Pharma Logistics)**  
lenograstim [biosynthetisch]  
inj./inf. oploss. (pdr. + solv.) i.v./s.c. [flac. + voorgev. spuit]  
5 x 33,6 MIE (0,263 mg) + 1 ml solv. R/ a <sup>!</sup> Ⓞ 382,24 €

## Lipegfilgrastim

**LONQUEX (Teva)**  
(lipeg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [flac.]  
6 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [3.931 €]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]

**LONQUEX (Abacus)**  
(lipeg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]  
(parallele distributie)

**LONQUEX (Orifarm Belgium)**  
(lipeg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [655 €]  
(parallele distributie)

## Pegfilgrastim

**NEULASTA (Amgen)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

**PELMEG (Mundipharma)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]


**PELMEG (Orifarm Belgium)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [494 €]  
(parallele distributie)

**PELGRAZ (Accord)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. pen]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

**PELMEG (Abacus)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]  
(parallele distributie)

**ZIEXTENZO (Sandoz)**  
(peg)filgrastim [biosynthetisch]  
inj. oploss. s.c. [voorgev. spuit]  
1 x 6 mg / 0,6 ml U.H. [532 €]

## Plerixafor

**MOZOBIL (Sanofi Belgium)**   
plerixafor  
inj. oploss. s.c. [flac.]  
1 x 24 mg / 1,2 ml U.H. [4.806 €]  
(weesgeneesmiddel)

## 2.3.4. Hydroxycarbamide

### Plaatsbepaling

- Hydroxycarbamide moet worden voorbehouden voor ernstige vormen van sikkelcelziekte (zie *Folia juli 2017*).



- Hydroxycarbamide wordt ook gebruikt als antitumoraal middel (zie 13.1.2.4).

### **Indicaties (synthese van de SKP)**

- Preventie van pijnlijke vaso-occlusieve crisissen bij sikkelcelanemie (vanaf de leeftijd van 2 jaar).

### **Contra-indicaties**


- Immunosuppressie.
- Zwangerschap en borstvoeding.
- Ernstige nierinsufficiëntie, ernstige leverinsufficiëntie (SKP).


### **Ongewenste effecten**

- Hematologische stoornissen.
- Gastro-intestinale stoornissen.
- Dyspneu, zelden interstitiële longaantasting.
- Ulcera en andere stoornissen van huid en slijmvliezen.
- Risico van secundaire maligniteit kan niet uitgesloten worden.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

- Er wordt aanbevolen om inname van hydroxycarbamide 3 tot 6 maanden vóór een zwangerschap te stoppen.
- Borstvoeding is een contra-indicatie.

*SIKLOS (Theravia)*   
hydroxycarbamide  
filmomh. tabl.

60 x 100 mg R/ a  87,66 €