

- De specialiteit op basis van de narcotische antagonist **naloxon (Narcan®)**, van de firma Bristol-Myers Squibb) werd om commerciële redenen wereldwijd van de markt teruggetrokken. De firma Merck heeft een derogatie verkregen om het geneesmiddel Naloxone Merck® (dat in België niet is geregistreerd) uit Frankrijk in België in te voeren en te verdelen. De apotheker die het geneesmiddel wenst af te leveren, kan dit bestellen bij de Belgische firma Merck: de apotheker dient daarbij de voorwaarden te respecteren vastgelegd in het K.B. van 6 juni 1960 betreffende “de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen”: bv. noodzaak van voorschrift op naam van de patiënt en van artsenverklaring [zie Folia juli 2004]. De apotheker kan ook zelf een specialiteit op basis van naloxon laten invoeren uit het buitenland, met respecteren van de hierboven geciteerde voorwaarden, bv. uit Frankrijk (Naloxone Merck® van de laboratoria Merck, of Narcan® van de laboratoria Serb).

- De comprimés aan 10 mg van de specialiteit **Seloken®** op basis van **metoprolol** werden van de markt teruggetrokken; dit kan problemen stellen bij gebruik van deze β -blokker in lage dosis bij hartfalen.

- Vanaf 20 april 2006 is in België de **aflevering van geneesmiddelen die efedrine bevatten**, verboden (met uitzondering van deze voor parenterale of nasale toediening) [M.B. van 17 september 2005, B.S. van 20 oktober 2005]. Volgende specialiteiten verdwijnen daardoor van de markt: bij de “Antitussiva, mucolytia en expectorantia” Broncal®, Bronchobel®, Clarix®, Colimax®, Folex®, Kamfeine®, Mepecton®; bij de “Tonica” Alfavit®. In verband met de risico's van gebruik van vasoconstrictoren langs orale weg, zie Folia december 1999, april 2002 en april 2004.

FLASH

- In de Folia van maart 2005 verscheen een artikel over reumatoïde artritis. Er werd vermeld dat, onder de *disease modifying antirheumatic drugs*, methotrexaat (in lage dosis) als eerste keuze beschouwd wordt, en dat **toediening van foliumzuur toelaat de ongewenste effecten van methotrexaat te verminderen** (bv. deze ter hoogte van de mucosae) zonder de doeltreffendheid ervan te verminderen. Als posologie voor foliumzuur wordt in dit artikel 10 mg vermeld, te geven de dag na toediening van methotrexaat (dat in principe eenmaal per week wordt gegeven). Er dient te worden opgemerkt dat verschillende posologieschema's voor foliumzuur voorgesteld zijn. Inderdaad is in meerdere placebo-gecontroleerde studies een gunstig effect gezien met foliumzuur, zowel wanneer toegediend aan 1 mg per dag, als wanneer toegediend aan 5 mg (eventueel te verhogen tot bv. 10 mg) eenmaal per week. Bij gebrek aan vergelijkende studies, bestaat er geen consensus over de optimale dosis en frequentie van toediening van foliumzuur. In de praktijk wordt foliumzuur vaak magistraal voorgeschreven in een dosis van 1 mg per dag. [*Rheumatology* 2004,43:267-71]