

- Hoofdstuk 3.4. Een nieuw **urinair antisepticum op basis van de plant beredruif** of *Arctostaphylos uva-ursi* L. (**Urocystil®** ▼, beschikbaar sinds mei 2008) wordt zonder veel argumenten voorgesteld voor de behandeling van niet-gecompliceerde cystitis bij de vrouw. Dit preparaat werd als geneesmiddel geregistreerd volgens de vereenvoudigde procedure ivm het traditionele gebruik van bepaalde planten [zie Folia december 2000]. De voornaamste ongewenste effecten zijn spijsverteringsstoornissen en levertoxiciteit bij langdurig gebruik.

- Hoofdstuk 5.2.7. **Nabumeton (Gambaran®** ▼) is een nieuw niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel, beschikbaar sinds mei 2008. Het gaat om een prodrug waarvan de belangrijkste metabool structureel verwant is aan naproxen. De plaats van nabumeton ten opzichte van andere NSAID's is niet duidelijk. Zijn ongewenste effecten, interacties, contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen zijn deze van de NSAID's in het algemeen.

- Hoofdstuk 7.1.3. Met de terugtrekking van de specialiteit **Oradexon®** (mei 2008) is er geen specialiteit meer voor oraal gebruik op basis van dexamethason. Magistraal voorschrijven is wel nog mogelijk.

- Hoofdstuk 9.1.1.1.10. Het vaccin tegen papillomavirus **Cervarix®** ▼ wordt sinds mei 2008 terugbetaald in categorie b voor meisjes die op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 jaar zijn, maar nog geen 16 jaar [in verband met HPV, zie Folia april 2008].

- Hoofdstuk 12.1.1.2. Een nieuw antibioticum voor dermatologisch gebruik op basis van **retapamuline 1% (Altargo®** ▼) is beschikbaar sinds mei 2008. Retapamuline is vooral bacteriostatisch tegen *Staphylococcus aureus* en *Streptococcus pyogenes*. Het wordt voorgesteld voor de kortetermijnbehandeling van oppervlakkige huidinfecties (zoals impetigo, geïnfecteerde wonden). Bij deze indicaties lijkt de doeltreffendheid vergelijkbaar met deze van fusidinezuur lokaal toegepast en van cefalexine oraal toegediend. Retapamuline is niet aangewezen bij infecties door of mogelijk te wijten aan meticilline-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA). De voornaamste ongewenste effecten van retapamuline zijn reacties ter hoogte van de applicatieplaats.

Flash

In geval van een **hittegolf**, is het nuttig speciale aandacht te schenken aan kwetsbare personen (bv. chronisch zieken, alleenstaande ouderen), en hun **chronische medicatie** opnieuw te evalueren. Bepaalde geneesmiddelen kunnen immers een hitteslag helpen uitlokken, of de effecten ervan verergeren (bv. diuretica, NSAID's, ACE-

inhibitoren, sartanen). Zie bericht in de rubriek "Goed om weten" op onze website van 30/05/08, waarin verwezen wordt naar aanbevelingen daaromtrent van de *National Health Service* (UK): "Heatwave: supporting vulnerable people before and during a heatwave - advice for health and social care professionals" (april 2008), via www.dh.gov.uk