

niet geregistreerd voor deze indicaties (situatie op 01/03/10).

- Bij voorkamerfibrillatie tonen de resultaten van de Re-Ly studie dat dabigatran (300 mg p.d.) na 2 jaar doeltreffender is dan warfarine voor de preventie van systemische trombo-embolie, met een vergelijkbaar risico van bloedingen, en dat dabigatran (220 mg p.d.) even doeltreffend is als warfarine met een geringer risico van bloedingen. Een significant hoger aantal gevallen van myocardiinfarct werd echter gezien bij de patiënten behandeld met dabigatran, evenals een hogere studie-uitval omwille van ongewenste gastro-intestinale effecten.

- Bij de behandeling van acute VTE tonen de resultaten van de Re-Cover studie dat dabigatran na 6 maanden even doeltreffend is als warfarine voor wat betreft de preventie van symptomatische recidieven, met vergelijkbaar risico van ongewenste effecten.

Er blijven evenwel nog een aantal onzekerheden, vooral wat betreft de optimale dosis en de veiligheid van dabigatran op lange termijn. Daarenboven kan de afwezigheid van een antidotum en van de mogelijkheid van biologische monitoring problemen stellen, bv. bij overdosering of ernstige bloeding.

Recente informatie

Het lijkt interessant de volgende nieuwe specialiteiten te signaleren.

- **ChondroCelect® ▼** (hoofdstuk 5.3.3., beschikbaar sinds februari 2010) is een suspensie van autologe kraakbeencellen, voorgesteld voor gebruik in hospitaal-milieu voor herstel van gelokaliseerde en symptomatische kraakbeenletsels.

- **Agrippal®** en **Fluad®** (hoofdstuk 9.1.1.1.3., beschikbaar sinds februari 2010) zijn twee nieuwe vaccins tegen **seizoensgebonden influenza**. Fluad® bevat een adjuvans en is enkel aangewezen bij ouderen boven de 65 jaar. De vaccins tegen influenza zullen uitgebreid aan bod komen in de Folia van augustus 2010.

Er dient ook gewezen te worden op een aantal schrappingen.

- **Buspiron (Buspar®)**, dat gebruikt werd als alternatief voor benzodiazepines bij angst, werd in februari 2010 van de markt teruggetrokken. [Zie Transparantiefiche « Aanpak van angststoornissen »].

- **Dimenhydrinaat (Paranausine®)**, een H₁-antihistaminicum dat vooral gebruikt werd als anti-emeticum, in het bijzonder bij nausea en braken tijdens de zwangerschap, werd in februari 2010 van de markt teruggetrokken. [Zie « Aanpak van nausea en braken tijdens de zwangerschap » in de Folia van juni 2002.