

bipolaire stoornis, migraine of neuropathische pijn⁶, moet bij zwangerschapswens de risico-batenverhouding opnieuw geëvalueerd worden. Topiramaat is in het kader van migraineprofylaxis gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen anticonceptie nemen. Ook valproïnezuur, dat *off-label* gebruikt wordt ter preventie van migraine, is bij deze vrouwen gecontra-indiceerd [zie ook Folia december 2014].

- Het is algemeen bekend dat toediening van foliumzuur rond de conceptie (8 weken vóór de conceptie tot minstens 8 weken na de conceptie) het risico van neuraalbuide-

fecten vermindert. Hoewel er bij vrouwen op anti-epileptica weinig onderbouwing bestaat over het effect van foliumzuur op het door het anti-epilepticum geïnduceerde risico van neuraalbuidefecten en over de optimale dosis foliumzuur, wordt bij deze vrouwen meestal extra inname van 4 à 5 mg per dag aanbevolen. Tijdens behandeling met anti-epileptica blijft ook prenatale diagnostiek (echografie, bepaling van het alfa-foetoproteïne rond week 16, eventueel vruchtwaterpunctie) aangewezen.

Nota

De referentielijst kan geraadpleegd worden via www.bcfi.be

6 Andere indicaties vermeld in de SKP, zijn:

- neuropathische pijn: carbamazepine, gabapentine, pregabaline;
- bipolaire stoornis: carbamazepine, lamotrigine, valproïnezuur;
- profylaxis van migraine: topiramaat;
- veralgemeende angst: pregabaline.

Recente informatie februari 2015

▼: geneesmiddel onder aanvullende monitoring, waarvoor het melden van ongewenste effecten aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking wordt aangemoedigd.

Anoro▼ (hoofdstuk 4.1.3.2.) is een vaste associatie van **umeclidiniumbromide** (een nieuw langwerkend anticholinergicum) + **vilanterol** (een langwerkend β_2 -mimeticum; zie 4.1.1.), voorgesteld in inhalatie voor de onderhoudsbehandeling van COPD. De associatie van een langwerkend β_2 -mimeticum en een langwerkend anticholinergicum is enkel zinvol indien één van deze twee bestanddelen onvoldoende doeltreffend is. De ongewenste effecten zijn deze van de twee bestanddelen. Zoals de andere anticholinergica voor in-

halatie, geeft umeclidinium anticholinerge ongewenste effecten (zie 4.1.2.), en voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een instabiele cardiovasculaire aandoening of gesloten-hoekglaucoom. Er is geen bewijs van meerwaarde van de associatie van umeclidinium + vilanterol ten opzichte van de andere associaties van langwerkende bronchodilatoren.¹

- De specialiteit **Pre-Par**® op basis van ritodrine, een β_2 -mimeticum dat gebruikt werd als tocolyticum, is uit de markt genomen in januari 2015.

1 *Pharma Selecta* 2014; 30:62-4; *Australian Prescriber*, First published online 19 december 2014