

geneesmiddelen stelt eveneens problemen. Op dit ogenblik zijn deze TNF-remmers voorbehouden voor de ernstige gevallen van evolutieve reumatoïde artritis die onvoldoende reageren op tenminste twee andere langzaamwerkende antireumatica, met inbegrip van methotrexaat. De TNF-remmers zijn niet onderling of met andere nieuwe immunosuppressiva vergeleken.

- Naar Les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. *La Revue Prescrire* **20**, 759-768 (2000)
H. Gebben en G. Olsder: Reumatoïde artritis, een farmacologisch progressieve aandoening. *Pharma Selecta* **16**, 133-136 (2000)
Etanercept and infliximab for rheumatoid arthritis. *Drug and Therapeutics Bulletin* **39**, 49-52 (2001)
Léflunomide et polyarthrite rhumatoïde. *La Revue Prescrire* **20**, 723-727 (2000)
Atteintes hépatiques graves sous léflunomide. *La Revue Prescrire* **21**, 359 (2001)
J. Kippel: Biologic therapy for rheumatoid arthritis. *New Engl. J. Med.* **343**, 1640-1641 (2000)

Specialiteitsnamen

Etanercept: Enbrel

Infliximab: Remicade (geregistreerd, maar niet gecommercialiseerd)

Léflunomide: Arava

FLASH

- De belangrijkste ongewenste effecten van disopyramide (DIRYTMIN, RYTHMODAN), een klasse I-anti-aritmicum, zijn te wijten enerzijds aan zijn anticholinerge effecten (accomodatiestoornissen, urineretentie ...), anderzijds aan zijn aritmogene effecten; hypoglykemie is eveneens beschreven. In *La Revue Prescrire* [**21**, 357 (2001)] werd recent de aandacht gevestigd op het risico van **interacties tussen disopyramide en bepaalde macroliden**. Meerdere gevallen van ernstige ritmestoornissen zijn beschreven bij gelijktijdige toediening van disopyramide en van erythromycine, clarithromycine of azithromycine; twee gevallen van ernstige hypoglykemie met coma zijn beschreven bij patiënten behandeld met disopyramide en clarithromycine. Het mechanisme van deze interacties tussen disopyramide en de macroliden is niet goed gekend, maar inhibitie door bepaalde macroliden van een enzym betrokken bij het metabolisme van disopyramide is vooropgesteld. Gezien inhibitie van CYP3A4 is gesuggereerd, is voorzichtigheid ook geboden bij gelijktijdige toediening van disopyramide met andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze CYP3A4 inhiberen, zoals ritonavir of ketoconazol, hoewel met deze associaties nog geen ongewenste effecten zijn gerapporteerd.