

Nota van de redactie

In België zijn nifedipine en indometacine niet geregistreerd voor deze indicatie. Atosiban (Tractocile) is geregistreerd voor deze indicatie, maar het is niet gecommmercialiseerd. Er is geen studie beschikbaar waarin nifedipine en atosiban werden vergeleken.

FLASH

➡ **Hoe droge mond na radiotherapie verbeteren ?** Xerostomie, of monddroogte, is een frequente complicatie van radiotherapie ter hoogte van hoofd en nek. In een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde dubbelblinde studie werden de doeltreffendheid en veiligheid van pilocarpine bij 207 patiënten met xerostomie door straling onderzocht [*New Engl. J. Med.* **329**, 390-395 (1993)]. Uit de resultaten blijkt dat ten opzichte van placebo, pilocarpine (5 mg p.d. in 3 giften) de monddroogte, het ongemak en de moeilijkheden bij het praten verbetert. De gerapporteerde ongewenste effecten waren weinig belangrijk, en het ging vooral om zweten; geen enkel ernstig ongewenst effect werd in deze studie gerapporteerd. In België bestaat er geen specialiteit op basis van pilocarpine voor oraal gebruik, maar het kan magistraal voorgeschreven worden (pilocarpinenitraat, 5 mg per gelule).

Er zijn onvoldoende gegevens over de doeltreffendheid van anetholtrithion (SULFARLEM) dat eveneens voorgesteld wordt voor de behandeling van iatrogeen speekseltekort.

➡ Volgens *La Revue Prescrire* [**20**, 830 (2000)] zijn in de Verenigde Staten en in Frankrijk de laatste jaren vergissingen gebeurd bij **aflevering van twee specialiteiten met op elkaar lijkende namen**, met name LAMICTAL (lamotrigine, een anti-epilepticum) en LAMISIL (terbinafine, een antimycoticum). Deze verwarring kan leiden tot status epilepticus wanneer terbinafine afgeleverd en ingenomen wordt in plaats van lamotrigine. Na inname van lamotrigine kunnen ernstige ongewenste effecten optreden, in het bijzonder ter hoogte van de huid. Andere voorbeelden van vergissingen bij aflevering ten gevolge van een verwarring in de specialiteitsnamen zijn reeds gepubliceerd in de *Folia* van februari 1994.

Men dient bijzonder voorzichtig te zijn bij voorschrijven en afleveren van specialiteiten waarvan de namen tot verwarring kunnen leiden. Bij twijfel over een specialiteitsnaam doet de apotheker er goed aan de indicatie waarvoor het geneesmiddel werd voorgeschreven, te verifiëren.