

studie het risico van coronairlijden reeds - en zelfs vooral - verhoogd was in het eerste jaar van gebruik. Het gebruik van hormonale substitutietherapie ter preventie van osteoporose moet kritisch worden geëvalueerd.

Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking

CONTRA-INDICATIE VAN TRIPTANEN BIJ ARTERIELE HYPERTENSIE

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving recent de melding van een hypertensieve patiënt met migraine die enkele minuten na een subcutane injectie van sumatriptan een cardio-respiratoire stilstand deed. In de literatuur zijn met sumatriptan meerdere gevallen van majeure cardiovasculaire problemen (myocardinfarct, ventrikelfibrillatie, Prinzmetal-angor, hemiparesie) beschreven, zonder dat het gemakkelijk is het causale verband te beoordelen [*La Revue Prescrire* **15**, 281-284 (1995) en **16**, 345-348 (1996)].

Het is belangrijk er aan te herinneren dat de triptanen - omwille van hun vasoconstrictorische eigenschappen - gecontra-indiceerd zijn bij patiënten met antecedenten of tekenen van ischemische cardiopathie, cerebrovasculair accident of ischemisch perifeer vaatlijden, alsook bij patiënten met niet-gecontroleerde arteriële hypertensie. Om dezelfde redenen is gelijktijdige toediening van triptanen en ergotderivaten gecontra-indiceerd. We verwijzen U ook naar het artikel "Aanvalsbehandeling van migraine" in de folia van april 1996.

BRONCHOSPASME DOOR ISOTRETINOÏNE ?

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving recent een melding van het optreden van bronchospasme bij een 24-jarige patiënt tijdens een behandeling met isotretinoïne (ROACCUTANE). Bronchospasme trad op na verhoging van de dosis (naar 40 mg p.d. in plaats van 20 mg p.d.). Er trad verbetering op na opnieuw dalen tot de lagere dosis, maar het bronchospasme verdween pas na stoppen van de behandeling. In een artikel in de *British Medical Journal* [**312**, 886 (1996)] worden 18 goed gedocumenteerde gevallen van astma gesignaleerd tijdens behandeling met isotretinoïne. In de rubriek « Ongewenste effecten » van de bijsluiter van ROACCUTANE wordt bronchospasme vermeld. Het mechanisme van dit ongewenst effect is niet bekend, maar zou kunnen te maken hebben met een uitdroging van de mucosa van de respiratoire tractus.