

overwogen. Bij de patiënten met frequente episodes van voorkamerfibrillatie moet een chronische antitrombotische behandeling met acetylsalicylzuur of orale anticoagulantia worden overwogen. [Zie ook Folia juli 2001 en januari 2004]

Naar

Camm AJ en Savelieva I. Some patients with paroxysmal atrial fibrillation should carry flecainide or propafenone to self treat. *Brit Med J* 2007;334:637

Recente informatie

- Hoofdstuk 1.4.6. Met de schrapping van Sufrexal® (augustus 2007) is er geen specialiteit meer op basis van **ketanserine**, een α -blokker met antiserotoninerge effecten die voorgesteld werd bij hypertensie.
- Hoofdstuk 1.9.2.2. **Bivalirudine (Angiox®)** is een nieuwe specifieke trombine-inhibitor, voorgesteld als anticoagulans bij percutane coronaire interventie (beschikbaar sinds augustus 2007).
- Hoofdstuk 8.4.3.4. De specialiteit op basis van **nelfinavir (Viracept®)** is momenteel niet meer beschikbaar.
- Hoofdstuk 11.1. **Deferasirox (Exjade®)** is een nieuwe ijzerchelator voor orale toediening, voorgesteld voor de behandeling van chronische ijzerstapeling (beschikbaar sedert augustus 2007). De belangrijkste ongewenste effecten zijn gastro-intestinale stoornissen, huidrupties en verhoging van de creatininespiegels.

Flash

- Op 13 september 2007 start voor de moslims de jaarlijkse **Ramadan**, een maand van vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Personen zoals zwangere vrouwen en chronisch zieken zijn vrijgesteld van vasten, maar velen onder hen zullen uit geloofsovertuiging er toch voor kiezen om te vasten. In de Folia van september 2006 werd aandacht besteed aan de problemen die het vasten kan stellen bij personen behandeld met geneesmiddelen die meerdere malen daags moeten worden genomen, en bij diabetespatiënten. Wat diabetes betreft, dient vasten zeker te

worden afgeraden aan patiënten met type 1-diabetes, patiënten met dreigende diabetescomplicaties, onstabiele of slecht gecontroleerde diabetes en zwangere vrouwen met diabetes. Wanneer diabetici toch wensen te vasten, is het belangrijk dat ze de glykemie regelmatig controleren, en dat het dosisschema van de antidiabetische middelen wordt geherevalueerd: zie daarvoor Folia september 2006, en overzichtsartikels in *Diabetes Care* [2005;28:2305-11, met lezersbrief in *Diabetes Care* 2006;29:744-6] en *Diabetes Research and Clinical Practice* [2006;73:117-25].