

nen zou moeten worden gevaccineerd, en dat de vaccinatie iedere 10 jaar zou moeten herhaald worden. Dit is organisatorisch waarschijnlijk moeilijk haalbaar, en de kostprijs is zeer hoog.

- De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt momenteel aan om prioriteit te geven aan de (her)vaccinatie van personen die frequent in

contact komen met zuigelingen (zie hoger); deze strategie wordt ook elders aanbevolen. De Hoge Gezondheidsraad onderzoekt welke strategie het meest doeltreffend zal zijn.

#### **Nota**

De referenties bij dit artikel zijn te vinden op onze website.

## **Goed om weten**

### **TUSSENKOMST VOOR SOMMIGE ACTIEVE VERBANDMIDDELEN BIJ PATIENTEN MET CHRONISCHE WONDEN**

[Zie ook “Goed om weten”-bericht op onze website van 31/7/2007]

Op 1 juli 2007 traden een aantal nieuwe maatregelen voor chronisch zieken in werking. We vermeldden al de tussenkomst door het RIZIV in de kostprijs van bepaalde pijnstillers voor chronische pijnpatiënten [zie Folia augustus 2007]. Ook kunnen patiënten met chronische wonden (wonden die na 6 weken behandeling onvoldoende

geheeld zijn) een tussenkomst bekomen in de kostprijs van sommige actieve verbandmiddelen. De lijst van deze verbandmiddelen wordt vermeld in annex 1 van het KB van 03.06.07 (BS 25.06.07).

Voor meer details, zie website RIZIV: [www.riziv.fgov.be](http://www.riziv.fgov.be) (zoekterm: “actieve verbandmiddelen”).

## **Flash**

- **Exenatide** (Byetta®) [n.v.d.r.: nog niet gecommmercialiseerd in België] is de eerste vertegenwoordiger van de « incretinomimetica », een nieuwe klasse van antidiabetica die, in functie van de glykemie, de insuline-secretie door de  $\beta$ -cellen van de pancreas verhogen, de glucagonsecretie inhiberen, en de maaglediging vertragen. Het wordt gebruikt in subcutane injectie voor de behandeling van type 2-diabetes in associatie met metformine en/of een hypoglykemiërend sulfamide; de dosis van exenatide moet niet aangepast worden in functie van de glykemie. Het risico van hypoglykemie is vooral

verhoogd wanneer exenatide geassocieerd wordt met een hypoglykemiërend sulfamide (waarvan de dosis moet worden aangepast). In tegenstelling tot insuline heeft exenatide het voordeel dat het leidt tot een daling van het lichaamsgewicht, maar nausea treedt zeer frequent op. De effecten van exenatide op lange termijn, in het bijzonder op de micro- en macrovasculaire complicaties van diabetes, evenals de veiligheid op lange termijn zijn niet bekend, waardoor zijn plaats bij de aanpak van type 2-diabetes op dit ogenblik beperkt is. [*Pharma Selecta* 2007;23:27-30]