

VACCINS TEGEN HUMAAN PAPILLOMAVIRUS: UITBREIDING VAN DE TERUGBETALING TOT EN MET DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR

[Reeds verschenen in de rubriek “Goed om te weten” op onze website op 27/11/08]

Sinds 1 december 2008 worden de vaccins tegen humaan papillomavirus (Cervarix®, Gardasil®) terugbetaald (categorie b) voor meisjes die op het ogenblik van de eerste toediening minimum 12 jaar zijn, maar nog geen 19 jaar (in plaats van “nog geen 16 jaar” voordien). Deze uitbreiding van de terugbetaling mag niet doen vergeten dat het belangrijk is dat de vaccinatie vóór de eerste seksuele contacten dient te gebeuren om optimaal kosteneffectief te zijn [zie Folia april 2008]. In de basisvaccinatiekalender van 2008, aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad (HGR), wordt vaccinatie tegen humaan papillomavirus aanbevo-

len bij meisjes van 10 tot en met 13 jaar. De HGR beveelt ook systematische cervixscreening aan, zowel voor de gevaccineerde als de niet-gevaccineerde vrouwen. Zoals vermeld in de Folia van april 2008 is cervixscreening het belangrijkste instrument in de preventie van invasieve baarmoederhalskanker en de daaraan gerelateerde sterfte, ook bij de gevaccineerde vrouwen. De aanbevelingen van de HGR in verband met de vaccinatie tegen infecties door humaan papillomavirus kunnen geraadpleegd worden via www.health.fgov.be/CSS_HGR (klik « Adviezen en Aanbevelingen »; zoekterm: HPV).

Lezersbrief

POSOLOGIE VAN DE ASSOCIATIE AMOXICILLINE + CLAVULAANZUUR

De posologie van de associatie amoxicilline + clavulaanzuur werd besproken in de Folia van september 2008. Er staat o.a. vermeld dat, bij luchtweginfecties, een dosis van minstens 3 g amoxicilline per dag bij de volwassene (ofwel 3 x p.d. 500 mg amoxicilline en 500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur, ofwel 2 x p.d. 2 comprimés Retard aan 1 g amoxicilline + 62,5 mg clavulaanzuur) aanbevolen is wegens vermindering van de gevoeligheid van de pneumokok aan amoxicilline.

Een lezer stelt ons de vraag of een dosis van 3 x per dag 1 compr. aan 875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur, wat overeenkomt met een hoeveelheid van 2,6 g amoxicilline per dag, een alterna-

tief kan zijn. De Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2008 van BAPCOC vermeldt inderdaad deze dosis als alternatief “om praktische redenen”.

Volgens het advies van een door ons geraadpleegde expert is een dosis van 2,6 g amoxicilline per dag meestal voldoende voor de behandeling van respiratoire pneumokokkeninfecties in België, maar er dient in dat geval wel op gelet dat de drie giften voldoende gelijkmatig gespreid zijn over de 24 uren van de dag.

Om farmacokinetische en farmacodynamische redenen is toediening van 2 x p.d. 2 comprimés Retard te verkiezen.