

ARTIKEL

Plaats van inhalatietherapie bij jonge kinderen in de ambulante praktijk. Deel 2: wheezing

Wheezing is frequent bij jonge kinderen en bij een acute episode is een kortwerkend β_2 -mimeticum de eerste keuze. Een inhalatiecorticosteroïd is de eerste keuze voor een onderhoudsbehandeling.

Type 2-diabetes: daling van de cardiovasculaire mortaliteit en van diabetische nefropathie met empagliflozine en liraglutide

Het effect van de recente antidiabetica op de vasculaire langetermijncomplicaties van diabetes is niet duidelijk aangetoond, en metformine blijft de eerste keuze bij de aanpak van type 2-diabetes.

Hoe duur mogen geneesmiddelen zijn? Het voorbeeld van hepatitis C-middelen

Enkele reflecties rond de problematiek van de hoge prijs van sommige, vooral nieuwe geneesmiddelen.

RECENTE INFORMATIE: januari 2017



Nieuwe specialiteiten:

- guanfacine
- elbasvir + grazoprevir en sofosbuvir + velpatasvir
- atorvastatine + perindopril + amlodipine



Geschrapte specialiteiten:

- indinavir
- autologe kraakbeencellen

GENEESMIDDELENBEWAKING

Ongewenste effecten op lange termijn na behandeling met chemotherapie als kind of adolescent

Deze maand in de Folia

De correcte indicatiestelling en aanwending van inhalatietherapie in de ambulante praktijk bij kinderen tot vijf jaar zijn niet altijd gemakkelijk. Daarom hadden we het in het oktobernummer van 2016 van de Folia reeds over de eerder beperkte plaats van deze therapie bij jonge kinderen in het kader van bronchiolitis. In dit nummer wordt de toch wel ruimere plaats bij het jonge kind met wheezing besproken.

Voor de aanpak van type 2-diabetes is het therapeutisch arsenaal de laatste jaren toch wel uitgebreid. Het is niet gemakkelijk om de plaats van de nieuwere middelen voor een concrete patiënt te bepalen. Het doel van het behandelen van diabetes is uiteindelijk om de levenskwaliteit en levensverwachting te optimaliseren, wat onder andere inhoudt dat diabetescomplicaties kunnen worden vermeden. Daarom is het nodig om regelmatig te evalueren welke evidentie er is voor antidiabetica dat ze deze harde eindpunten beïnvloeden. In dit nummer van de Folia wordt ingegaan op wat studiegegevens over empagliflozine en liraglutide ons hierover kunnen bijbrengen.

De hoge prijs van sommige nieuwe geneesmiddelen leidt tot heel wat problemen, zowel beleidsmatig voor de overheid als in de praktijk voor wie met een concrete patiënt geconfronteerd wordt. Er is duidelijk nood aan meer transparantie rond de prijszetting en daarnaast moeten nieuwe strategieën ingevoerd worden om het evenwicht tussen de kost van de ontwikkeling van innovaties beter te doen aansluiten bij de prijs die voor het gebruik van die innovaties moet betaald worden.