

ARTIKEL

Zwangerschap en borstvoeding: medicamenteuze behandeling van gastro-oesofageale reflux

Tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding kan de vrouw met symptomen door gastro-oesofageale reflux, indien niet medicamenteuze maatregelen niet volstaan, als eerste keuze antacida gebruiken. Indien deze onvoldoende werkzaam zijn, kan ranitidine of een PPI gebruikt worden. Gastropromotica hebben er geen plaats.

GOED OM TE WETEN

De suggestie van een negatieve invloed van paracetamol op wheezing of astma bij jonge kinderen, wordt verder verzwakt

TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2015

Controverse over de uitbreiding van de indicaties van empagliflozine

RECENTE INFORMATIE: maart 2017



Nieuwe specialiteiten in de ambulante zorg:

- oraal osmotisch laxativum op basis van natrium-, magnesium- en kaliumsulfaten
- vaccin tegen meningokokken van serogroep B



Nieuwe specialiteiten in de oncologie:

- daratumumab
- cobimetinib



Geschrapte specialiteiten:

- anticonceptivum op basis van ethinylestradiol en norethisteron

GENEESMIDDELENBEWAKING

Medicatiefouten met tramadol in druppels voor oraal gebruik: aandacht voor de correcte dosis!

.....

Deze maand in de Folia

Voor zwangere vrouwen, maar ook voor vrouwen die borstvoeding geven, is het verstandig om het geneesmiddelengebruik zoveel als mogelijk te beperken. Toch zijn er een aantal, soms specifiek aan de zwangerschap gerelateerde aandoeningen, waarvoor een geneesmiddelenbehandeling nodig kan zijn. In de Folia willen we een aantal van die specifieke probleemsituaties bespreken: in dit nummer behandelen we het probleem van **gastro-oesofageale reflux bij de zwangere of zogende vrouw**.

De grote hoeveelheid aan patiëntengegevens uit elektronische dossiersystemen waarover men tegenwoordig beschikt, maakt het verleidelijk om hierop tal van analyses te doen en deze onderzoeksgegevens te publiceren. Over geneesmiddelen verschijnen dan ook zeer regelmatig dergelijke publicaties. Daarenboven lijkt het, door de aard van het bronmateriaal (data uit dossiers), alsof dit objectieve gegevens zijn met alle nodige randinformatie. De realiteit is echter dikwijls anders, waarbij bijvoorbeeld enkel wat vlot te klasseren en te coderen is in de data-analyse terecht komt. Dergelijke onderzoeksmethoden zijn echter, zoals alle observationele studies, onderhevig aan verschillende vormen van bias en de aanwezigheid van *confounding factors*. Deze vorm van bias kan er mede oorzaak van zijn dat **paracetamolgebruik op jonge leeftijd** in verband is gebracht met een verhoogd risico van **wheezing en astma**. Dit verband werd recent **tegengesproken** door gegevens uit een gerandomiseerde dubbelblinde studie.

De jaarlijkse publicatie van de **uitgaven van het RIZIV voor geneesmiddelen in de ambulante sector** is telkens een goede aanleiding om te reflecteren over het kosten-baten aspect van geneesmiddelen. In deze Folia worden enkele geneesmiddelen(groepen) uit de top 25 van 2015 onder de loep genomen.