

REIZEN EN GENEESMIDDELEN

Zelfbehandeling van reizigersdiarree: goed gebruik van antibiotica

Een restrictiever antibioticumgebruik bij zelfbehandeling van reizigersdiarree wordt aanbevolen. In de situaties waar een antibioticum noodzakelijk is, is azithromycine steeds het eerstekeuzeantibioticum; chinolonen worden in deze context verlaten.

Medicamenteuze profylaxe van malaria

De beslissing om medicamenteuze malariaprofylaxe te starten, alsook de keuze van het geneesmiddel moeten steeds gebeuren op maat van de individuele reiziger.

Certificaat van vaccinatie tegen gele koorts levenslang geldig

Het certificaat van vaccinatie tegen gele koorts is bij de meeste personen levenslang geldig.

Vaccinatie tegen polio

Bij reizen naar gebieden waar er nog risico van polio bestaat, is het van belang om de meest recente richtlijnen inzake de nood aan een herhalingsinenting tegen polio op te volgen.

FLASH

Aripiprazol en compulsief gedrag

GOED OM TE WETEN

Verhogen hormonale anticonceptiva het risico van depressie?

Recente gegevens versterken het vermoeden dat hormonale anticonceptiva het risico van depressie kunnen verhogen, en vooral bij adolescenten met risico van depressie is voorzichtigheid geboden.

Epilepsie en geneesmiddelengebruik

Recente Belgische gegevens tonen dat valproïnezuur het meest gebruikte anti-epilepticum is. Omwille van het belangrijke teratogene risico moet valproïnezuur bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd vermeden worden.

RECENTE INFORMATIE: april 2017



Nieuwe specialiteiten:

- selexipag
- ixekizumab
- daclizumab
- migalastat

GENEESMIDDELENBEWAKING

Diarree van medicamenteuze oorsprong

.....

Deze maand in de Folia

Naar jaarlijkse gewoonte wordt in het meinumner van de Folia aandacht besteed aan geneesmiddelengebruik dat gerelateerd is aan reizen.

- In verband met de zelfbehandeling van reizigersdiarree is er dit jaar een fundamenteel gewijzigde aanpak. De chinolonen worden in deze context volledig verlaten, en azithromycine is het enig antibioticum dat nog voor zelfbehandeling in aanmerking komt; azithromycine dient echter zeer restrictief gebruikt te worden.
- Ook aan de vaccinatiestatus voor polio wordt in dit Folianummer aandacht besteed in verband met reizen naar gebieden waar er nog risico van polio bestaat. Hierbij is het van belang om de meest recente richtlijnen op te volgen. Afhankelijk van de bestemming en de duur van de reis is een herinenting verplicht, sterk aanbevolen of eventueel te overwegen. Hierbij gaat het niet alleen om de bescherming van de reiziger zelf, maar ook om te zorgen dat de reiziger geen drager wordt en anderen niet gaat besmetten.

Zoals het voor tal van andere klachten het geval is, is het ook bij optreden van diarree belangrijk te overwegen of deze klacht niet het gevolg is van geneesmiddelengebruik. Voor sommige geneesmiddelen is de associatie goed gekend, zoals voor antibiotica die de darmflora kunnen beïnvloeden. Voor andere middelen is de associatie minder gekend, zoals voor olmesartan. Daarom wordt in dit Folianummer op deze problematiek ingegaan.