

ARTIKELS

Geen argumenten voor behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen

Een grootschalige gerandomiseerde studie bij personen ≥ 65 jaar met subklinische hypothyreoïdie toont geen voordeel van levothyroxine ten opzichte van placebo op de primaire eindpunten (symptomen, moeheid) of de secundaire eindpunten (o.a. levenskwaliteit, cardiovasculaire events).

Lactatiebevordering door geneesmiddelen: domperidon alleen bij moeders van premature kinderen; metoclopramide steeds af te raden

In dit artikel wordt de plaats besproken van domperidon en metoclopramide ter bevordering van lactatie, voor beide geneesmiddelen een *off-label*-gebruik. Enkel bij moeders van premature kinderen kan domperidon in bepaalde gevallen een optie zijn, maar er blijven vele onzekerheden en men dient bedacht te zijn op het risico van QT-verlenging door domperidon.

GOED OM TE WETEN

De direct werkende antivirale middelen bij chronische hepatitis C: recente controverses over hun klinische waarde

Er zijn voor deze middelen te weinig klinische gegevens van goede kwaliteit uit gerandomiseerd onderzoek om effecten op harde eindpunten (mortaliteit en morbiditeit) op lange termijn te kunnen beoordelen, en hun kosten-batenverhouding te kunnen inschatten. Hun gunstig effect op de *sustained virological response* op korte termijn volstaat niet om de effecten op harde eindpunten te voorspellen. Meer onderzoek is nodig.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is sinds juli 2017 het expertisecentrum rabiës in België

Het RIZIV wenst door twee recente maatregelen lokale MFO-projecten aan te moedigen

Door een vereenvoudigde aanvraagprocedure en aangepaste financiering worden MFO-projecten aangemoedigd door het RIZIV.

RECENTE INFORMATIE: oktober 2017



Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde

- tofacitinib



Nieuwigheden in de oncologie

- ixazomib



Schrappingen

- melkzuur
- prednison

Andere wijzigingen

- haloperidol

GENEESMIDDELENBEWAKING

Vergissingen in de dosering van methotrexaat: dagelijkse inname in plaats van wekelijkse

Deze maand in de Folia

Bij ouderen worden regelmatig bloedanalyses uitgevoerd waarbij er gescreend wordt hoe het gesteld is met de schildklier. De vraag rijst dan hoe om te gaan met eventuele afwijkende waarden bij patiënten zonder specifieke symptomen. In deze Folia wordt bekeken of het nodig is om bij ouderen een subklinische hypothyreoïdie te behandelen.

Borstvoeding heeft tal van voordelen voor de zuigeling. Toch zijn er soms obstakels. Uiteraard zijn een aantal praktische adviezen zeer nuttig om de kans op succes te vergroten. Daarnaast kan voor moeders van premature baby's een medicamenteuze aanpak soms nuttig zijn. Hierbij is het belangrijk om de eventuele risico's voor moeder en kind goed af te wegen tegenover het voordeel van een dergelijke aanpak. Meer hierover in dit nummer van de Folia.

Als studiegegevens over een nieuw geneesmiddel positieve resultaten tonen, is het logisch dat zowel de ontwikkelaars als de betrokken onderzoekers hierover enthousiast zijn. Dit was zeker ook het geval voor de direct werkende antivirale middelen bij chronische hepatitis C. Toch is het zo dat de beschikbare studies vooral afwezigheid van het virus in het bloed aantonen, en niet toelaten de klinische waarde, met name de langetermijnpact op mortaliteit en morbiditeit, in te schatten.